



NUJOL®
petrolato líquido
óleo mineral puríssimo

NUJOL é um óleo mineral puríssimo utilizado no tratamento da prisão de ventre. Pode também ser utilizado para prevenir e tratar o ressecamento da pele, pois amacia as áreas ressecadas e ásperas.

Nujol deve ser conservado em temperatura entre 2°C e 30°C, protegido da luz.

O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o produto.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

A segurança do uso de NUJOL durante a gravidez ainda não foi estabelecida.

NUJOL é indigerível e pouco absorvido. NUJOL não engorda.

Indicações

NUJOL é indicado como laxante, no tratamento da constipação intestinal funcional (prisão de ventre), assim como no pré-operatório e no esvaziamento do cólon para a realização de exames. Utilizado na pele, amacia as áreas ressecadas e ásperas.

Contra-indicações

Não fazer uso de NUJOL quando da presença dos seguintes sintomas: náuseas, vômitos, dor abdominal à esclarecer, gravidez, dificuldade de deglutição, pacientes acamados. **Não deve ser utilizado por crianças menores de 2 anos (administração retal) e crianças menores de 6 anos (administração oral).**

Precauções e Advertências

Laxantes não devem ser utilizados por mais de uma semana a menos que indicado por um médico. Não administrar NUJOL junto com alimentos ou quando houver presença de hemorragia retal. Se notar alteração repentina dos hábitos intestinais durante 2 semanas, consulte um médico antes de fazer uso de laxantes. Desaconselhável após cirurgia anorretal, pois poderá causar prurido anal. A exposição ao sol após a aplicação do produto na pele pode provocar queimaduras. O produto não contém protetor solar e não protege contra os raios solares.

Uso durante a gravidez e a lactação

O uso crônico durante a gravidez pode causar hipoprotrombinemia e doença hemorrágica do recém-nascido.

Interações Medicamentosas

O emprego prolongado pode reduzir a absorção das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e alguns medicamentos administrados por via oral, como anticoagulantes orais (cumarínicos ou indandiônicos), anticoncepcionais orais e glicosídeos digitálicos.

Reações Adversas

Efeitos metabólicos: relato de redução do nível sérico de betacaroteno; pode diminuir a absorção de vitamina A, D, E e K; pode afetar a absorção de cálcio e fosfatos.

Efeitos gastrintestinais: dosagem oral excessiva pode resultar em incontinência anal e prurido anal.

Efeitos respiratórios: pneumonite lipídica e embolismo com óleo mineral foram relatados em uma criança com 5 meses com doença de Hirschsprung que recebeu vários enemas para tratamento de fezes impactadas – acredita-se que o óleo mineral tenha acesso ao pulmão por via linfática. Pneumonia lipídica pode acontecer após ingestão oral e consequente aspiração do óleo mineral. Os menores de 6 anos, idosos, debilitados e indivíduos com disfagia estão mais sujeitos à aspiração de gotículas de óleo que podem levar a pneumonia lipídica.

Posologia

No tratamento da prisão de ventre, 1 colher de sopa à noite e outra no dia seguinte ao despertar. Caso não obtenha êxito, aumente a dosagem para 2 colheres à noite e 1 pela manhã.

Crianças maiores de 6 anos: ½ colher de sopa a noite ou pela manhã (1-2ml / kg de peso de Nujol).

Administração a crianças menores de 6 anos, consulte o seu médico.

Superdose

Dose oral excessiva pode resultar em incontinência anal e prurido anal.

Pacientes idosos

Não se recomenda seu uso para pacientes idosos. Os idosos estão mais sujeitos à aspiração de gotículas de óleo que podem produzir pneumonia lipídica.

Composição: petrolato líquido (óleo mineral).

NUJ07/JUL/06