

## TEXTO DE CARTUCHO

**Mylanta® Plus**  
**hidróxido de alumínio 400 mg/5mL**  
**hidróxido de magnésio 400 mg/5mL**  
**simeticona 30 mg/5mL**

**Sabor Menta**

**Suspensão oral**

## ANTIÁCIDO

**ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES**

## USO ADULTO

**Contém 1 frasco com 240 mL**

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

**Indicações:** alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas conseqüentes a gases.

**Contra-indicações:** **Mylanta® Plus é contra-indicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.**

**Advertências e precauções:** informe a um médico a ocorrência de gravidez durante e após o término do tratamento, ou ainda se estiver amamentando. Pacientes com disfunção renal não devem utilizar o produto. **Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser utilizado com cautela em diabéticos.**

**Reações adversas:** alterações discretas de trânsito intestinal, hipermagnesemia, intoxicação por alumínio, encefalopatia, osteomalácia e hipofosfatemia.

**Modo de usar:** 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

## USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR.

**Composição:** 400 mg de hidróxido de alumínio, 400 mg de hidróxido de magnésio e 30 mg de simeticona a cada 5 mL.

**Excipientes:** propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma natural de hortelã, essência de limão, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.

Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS – 1.5721.0007.004-8

Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

Lote nº:

Data de fabr.:

Prazo val.:

**Produto fabricado e embalado por:**

Nycomed Pharma Ltda.

Jaguariúna – SP

CNPJ nº 60.397.775/0008-40

**Distribuído por:**

**Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.**

Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 59.748.988/0001-14

Indústria Brasileira

Serviços ao Consumidor

0800 728 6767

[www.injbrasil.com.br](http://www.injbrasil.com.br)

(ESPAÇO PARA TINTA REATIVA)

## TEXTO DE RÓTULO

**Mylanta® Plus**  
**hidróxido de alumínio 400 mg/5mL**  
**hidróxido de magnésio 400 mg/5mL**  
**simeticona 30 mg/5mL**

**Sabor Menta**

**Suspensão oral**

### ANTIÁCIDO

**ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES**

### USO ADULTO

**Conteúdo: 240 mL**

**Indicações:** alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas consequentes a gases.

**Modo de usar:** 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

### USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR

Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

**Contra-indicações, Reações Adversas, Advertências e Precauções:** vide cartucho.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS – 1.5721.0007.004-8

Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

Lote nº:  
Prazo val.:

**Distribuído por:**

**Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.**

Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 59.748.988/0001-14

Indústria Brasileira

Serviços ao Consumidor

0800 728 6767

[www.jnjbrasil.com.br](http://www.jnjbrasil.com.br)

## TEXTO DE CARTUCHO

**Mylanta® Plus**  
**hidróxido de alumínio 400 mg/5mL**  
**hidróxido de magnésio 400 mg/5mL**  
**simeticona 30 mg/5mL**

**Sabor Morango**

**Suspensão oral**

### ANTIÁCIDO

**ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES**

### USO ADULTO

**Contém 1 frasco com 240 mL**

### INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

**Indicações:** alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas conseqüentes a gases.

**Contra-indicações:** Mylanta® Plus é contra-indicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula.

**Advertências e precauções:** informe a um médico a ocorrência de gravidez durante e após o término do tratamento, ou ainda se estiver amamentando. Pacientes com disfunção renal não devem utilizar o produto. **Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser utilizado com cautela em diabéticos.**

**Reações adversas:** alterações discretas de trânsito intestinal, hipermagnesemia, intoxicação por alumínio, encefalopatia, osteomalácia e hipofosfatemia.

**Modo de usar:** 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

### USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR.

**Composição:** 400 mg de hidróxido de alumínio, 400 mg de hidróxido de magnésio e 30 mg de simeticona a cada 5 mL.

*Excipientes:* propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma artificial de morango, corante vermelho, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.

Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS – 1.5721.0007.010-2

Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

Lote nº:

Data de fabr.:

Prazo val.:

**Produto fabricado e embalado por:**

Nycomed Pharma Ltda.

Jaguariúna - SP

CNPJ nº 60.397.775/0008-40

**Sob Encomenda de:**

**Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.**

Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 59.748.988/0001-14

Indústria Brasileira

Serviços ao Consumidor

0800 728 6767

**[www.jnjbrasil.com.br](http://www.jnjbrasil.com.br)**

(ESPAÇO PARA TINTA REATIVA)

## TEXTO DE RÓTULO

**Mylanta® Plus**  
**hidróxido de alumínio 400 mg/5mL**  
**hidróxido de magnésio 400 mg/5mL**  
**simeticona 30 mg/5mL**

**Sabor Morango**

**Suspensão oral**

### **ANTIÁCIDO**

**ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES**

### **USO ADULTO**

**Conteúdo: 240 mL**

**Indicações:** alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas conseqüentes a gases.

**Modo de usar:** 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

### **USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR.**

Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

**Contra-indicações, Reações Adversas, Advertências e Precauções:** vide cartucho.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

MS – 1.5721.0007.010-2

Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

Lote nº:  
Prazo val.:

**Distribuído por:**  
**Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.**  
Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP  
CNPJ: 59.748.988/0001-14  
Indústria Brasileira

Serviços ao Consumidor  
0800 728 6767  
[www.jnjbrasil.com.br](http://www.jnjbrasil.com.br)

S. José dos Campos, 04 de Junho de 2007.

Bárbara Neves Pacini e Silva  
Representante Legal

Nilo Lemos Cobeiros  
Responsável Técnico Substituto  
CRF nº 9562