

ALDOMET[®]

(metildopa)



bula Paciente

Formas Farmacêuticas e Apresentações

ALDOMET[®] (metildopa) é apresentado em caixa contendo blisters com 30 comprimidos revestidos de 250 mg e caixa contendo blisters com 30 comprimidos revestidos de 500 mg.

Uso Oral

Uso Adulto

Ingrediente ativo

Cada comprimido revestido de ALDOMET[®] contém 250 mg ou 500 mg de metildopa.

Ingredientes inativos

Cada comprimido revestido de ALDOMET[®] contém os seguintes ingredientes inativos: ácido cítrico, edetato de cálcio dissódico, etilcelulose, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio, goma guar, hidroxipropilmetilcelulose, dióxido de titânio, talco, propilenoglicol, celulose em pó, álcool anidro, corante amarelo D&C n° 10 alumínio laca e vermelho Mapico.

Como este medicamento funciona?

ALDOMET[®] é um medicamento que pertence a um grupo de fármacos chamado agentes simpatolíticos de ação central.

ALDOMET[®] age diminuindo os impulsos do sistema nervoso central que aumentam a pressão arterial. A redução máxima da pressão arterial ocorre de quatro a seis horas após tomar o medicamento.

Por que este medicamento foi indicado?

O seu médico lhe receitou ALDOMET[®] para tratar sua hipertensão (pressão alta).

Informações ao paciente com pressão alta

O que é pressão arterial?

É a pressão gerada pelo seu coração ao bombear o sangue para todas as partes do corpo; sem a pressão arterial, o sangue não circula pelo corpo. Uma pressão arterial normal é essencial para uma boa saúde.

A pressão arterial sofre alterações durante o dia, dependendo da atividade, do estresse e da excitação a que as pessoas estão expostas. A leitura da pressão arterial é composta de dois números, por exemplo, 120/80 (lê-se: cento e vinte por oitenta). O número mais alto representa a força medida enquanto seu coração está bombeando sangue, enquanto o número mais baixo representa a força medida em repouso, entre os batimentos cardíacos.

O que é pressão alta (ou hipertensão)?

Uma pessoa tem pressão alta ou hipertensão quando sua pressão arterial é alta mesmo quando se está calmo (a) e relaxado (a). Observa-se pressão alta quando os vasos sanguíneos se estreitam e dificultam o fluxo do sangue pelo corpo.

Como saber se tenho pressão alta (ou hipertensão)?

Em geral, a pressão alta não causa sintomas. A única maneira de saber se você tem hipertensão é medindo sua pressão arterial; por isso, você deve medir sua pressão arterial regularmente.

Por que a pressão alta (ou hipertensão) deve ser tratada?

Se não for tratada, a pressão alta pode causar danos a órgãos essenciais para a vida, tais como o coração e os rins. Você pode estar se sentindo bem e não apresentar sintomas, mas a hipertensão pode causar derrame (acidente vascular cerebral), ataque cardíaco (infarto do miocárdio), insuficiência cardíaca, insuficiência renal ou perda da visão.

Seu médico pode lhe dizer qual a pressão arterial ideal para você. Memorize o valor estipulado por ele e siga suas recomendações para atingir a pressão arterial ideal para você.

Quando não devo usar este medicamento?

Contra-Indicações

Você não deve tomar ALDOMET[®] se:

- For alérgico a qualquer um de seus ingredientes (veja o item **O que é ALDOMET[®]?**);
- Tiver doença do fígado, tais como hepatite aguda ou cirrose ativa;
- Estiver tomando inibidores da monoaminoxidase (MAO).

Procure seu médico se você não tem certeza se deve iniciar o tratamento com ALDOMET[®].

Advertências

Uso na gravidez e na amamentação

Você deve informar ao seu médico se estiver grávida ou se pretende engravidar.

ALDOMET[®] é excretado no leite materno. Você deve informar ao seu médico se estiver amamentando ou se pretende amamentar.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Uso pediátrico

ALDOMET[®] comprimidos não deve ser administrado a crianças.

O que devo dizer para o meu médico antes de tomar ALDOMET[®]?

Precauções

Informe seu médico sobre quaisquer problemas de saúde ou alergias que esteja apresentando ou tenha apresentado.

Informe seu médico se:

- Tiver asma;
- Estiver sendo submetido à diálise;
- Já tiver apresentado problema no fígado;
- For alérgico (a) a sulfitos (se necessário, pergunte ao seu médico o que são sulfitos);
- Estiver recebendo tratamento para pressão alta causada por feocromocitoma (um tipo de tumor localizado próximo aos rins). ALDOMET[®] não é recomendado para o tratamento dessa condição.

Antes de cirurgia e anestesia (mesmo no consultório odontológico), informe ao médico ou ao dentista que está tomando ALDOMET[®], pois pode ocorrer queda repentina da pressão arterial associada à anestesia.

ALDOMET[®] pode interferir na medição de alguns agentes químicos de ocorrência natural no sangue e urina; portanto, lembre seu médico de que está tomando ALDOMET[®] quando forem solicitados exames de laboratório.

Este medicamento contém corantes que podem eventualmente causar reações alérgicas.

Posso dirigir ou operar máquinas enquanto estiver tomando ALDOMET[®]?

Possíveis efeitos adversos como tontura e aturdimiento podem afetar a capacidade de alguns pacientes de dirigir ou operar máquinas (veja **Quais efeitos adversos ALDOMET[®] pode causar?**).

Posso tomar ALDOMET® com outros medicamentos?

Interações Medicamentosas

Em geral, ALDOMET® pode ser tomado com outros medicamentos. Entretanto é importante informar ao seu médico os outros medicamentos que você estiver tomando, inclusive os que são vendidos sem receita, pois alguns medicamentos podem afetar a ação dos outros.

É muito importante que seu médico saiba se você está tomando outros medicamentos para reduzir a pressão arterial ou se você está tomando, ferro ou suplementos de ferro ou lítio (medicamento utilizado para o tratamento de um tipo de depressão). Você também deve informar seu médico se está tomando inibidores da monoaminoxidase (MAO) antes de iniciar o tratamento com ALDOMET® (veja **Quando não devo usar este medicamento?**).

Informe seu médico ou cirurgião-dentista sobre o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não há contra-indicação relativa à faixa etária, exceto para crianças (veja Uso Pediátrico).

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico; pode ser perigoso para a sua saúde.

Como devo usar este medicamento?

Aspectos físicos

ALDOMET® 250 mg: comprimidos revestidos de cor amarela, redondos, biconvexos, com a inscrição "250" gravada em um lado e ALDOMET do outro.

ALDOMET® 500 mg: comprimidos revestidos de cor amarela, redondos, biconvexos, com a inscrição "500" gravada em um lado e ALDOMET do outro.

Características organolépticas

Veja Aspectos físicos.

Dosagem

Seu médico irá decidir a dose adequada, dependendo de sua condição e se está ou não tomando outros medicamentos.

Tome ALDOMET® diariamente, exatamente conforme a orientação de seu médico. É muito importante que você continue tomando ALDOMET® pelo tempo prescrito pelo seu médico e que não tome mais comprimidos do que a dose prescrita.

A dose inicial usual de ALDOMET® é de 250 mg duas ou três vezes ao dia nas primeiras 48 horas. A partir daí, a dose diária será definida pelo seu médico, dependendo da sua resposta ao tratamento.

Não dê os seus comprimidos de ALDOMET® para outra pessoa. Eles foram prescritos por seu médico somente para você.

Como usar

A maioria das pessoas toma ALDOMET® com um pouco de água.

O que fazer se eu esquecer de tomar uma dose?

Deve-se tomar ALDOMET® conforme a prescrição. Se você deixou de tomar uma dose, deverá tomar a dose seguinte como de costume; isto é, na hora regular e sem duplicar a dose.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar observe o aspecto do medicamento.

Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.

Quais efeitos adversos ALDOMET® pode causar?

Reações

Qualquer medicamento pode apresentar efeitos inesperados ou indesejáveis, denominados efeitos adversos. ALDOMET® em geral é bem tolerado e os efeitos adversos decorrentes de sua utilização incluem tontura, dor de cabeça, cansaço e fraqueza; outros efeitos adversos incluem distúrbios do fígado (icterícia [amarelamento da pele], testes da função do fígado anormais), febre e baixas contagens sanguíneas. Seu médico poderá solicitar exames de sangue durante os primeiros meses de tratamento com ALDOMET®.

ALDOMET® também pode interferir na interpretação de alguns exames de sangue e urina.

Raramente também podem ocorrer outros efeitos adversos, alguns deles podendo ser graves. Solicite ao seu médico mais informações sobre os efeitos adversos, pois ele possui uma lista mais completa.

Informe seu médico imediatamente se você apresentar alguma dessas reações adversas ou outras reações adversas incomuns.

O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?

Avise seu médico imediatamente para que ele possa agir imediatamente. Os sintomas mais prováveis de superdosagem são tontura ou aturdimiento (devido à queda da pressão arterial), sedeção excessiva, fraqueza, diminuição da frequência cardíaca, prisão de ventre, distensão abdominal, gases, diarreia, náuseas e vômitos.

Onde e como devo guardar este medicamento?

Conserve a embalagem fechada, em temperatura ambiente (entre 15 °C – 30 °C), protegida da luz e da umidade.

Não tome este medicamento após a expiração da data de validade impressa na embalagem.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Dizeres Legais

Registro M.S.: 1.3764.0117

Farmacêutico Responsável: Dra. Juliana Aguirre M. Pinto CFR-ES 3198

Fabricado por: ASPEN Port Elizabeth Ltd. Crn Fairclough Road and Gibaud Road, Korsten

Port Elizabeth 6020

Republic of South Africa

Importado por: **Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.**

Avenida Acesso Rodoviário, Módulo 01, Quadra 09, TIMS- Serra-ES

CNPJ: 02.433.631/0001-20- Indústria Brasileira

Venda Sob Prescrição Médica

