Repopil® 35

etinilestradiol + acetato de ciproterona

Legrand

FORMA FARMACÉUTICA E APRESENTAÇÕES

Comprimido revestido. Embalagem contendo 1 ou 3 blister(s)-calendário com 21 comprimidos revestidos.

USO ORAL USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:
Cada comprimido revestido contém:
etinilestradiol.....0,035 mg
acetato de ciproterona.....2 mg
excipientes (s.p.a.).....com rev. 1 mg
* Com ferro vermelho, amido níquel-potássico, lactato croscarmeloso sódico, lactose monohidratada, butilmetilcelulose de sódio, polímero coloidal do ácido metacrílico, estearato de magnésio, dióxido de titânio, macrógol.

INFORMAÇÕES À PACIENTE

REPOPIL® 35 é um produto de prescrição médica. Portanto, somente um médico poderá indicar se este produto é o melhor para você. Não utilize o produto por conta própria.

Ação do medicamento

REPOPIL® 35 é um medicamento indicado para o tratamento de doenças relacionadas aos hormônios androgênicos produzidos pelo organismo feminino. Com o comprimido revestido contém uma combinação de dois hormônios (estrogênio e progestágeno) e o acetato de ciproterona (progestágeno com propriedades antiandrogênicas e devido à pequena quantidade de hormônios, **REPOPIL® 35** é considerado um medicamento de baixa dose. O acetato de ciproterona inibe a infiltração dos hormônios androgênicos. Portanto, é possível tratar doenças causadas pelo aumento da produção de androgênios ou por uma sensibilidade anormal. Durante a terapia com **REPOPIL® 35**, reduz-se a função excessiva das glândulas sebáceas, as quais desempenham um papel importante no desenvolvimento da acne e da seborréia. Isso usualmente conduz à resolução das erupções da acne preexistentes, normalmente verificada após 3 a 4 meses de terapia. A oleosidade excessiva dos cabelos e pele geralmente desaparece mais cedo. A perda de cabelo, frequentemente verificada após a interrupção do tratamento com **REPOPIL® 35** é indicada para mulheres em idade reprodutiva que exibem formas leves de hirsutismo (excesso de pelo), e, em particular, nos casos de leve aumento de pelos faciais. Entretanto, os resultados apenas tornam-se visíveis após vários meses de tratamento.

No tratamento de mulheres com síndrome de ovários policísticos (SOP), **REPOPIL® 35** alivia os sinais de androgenização, leva à normalização dos parâmetros endócrinos, a redução da produção de cistos e do volume ovariano e auxilia na regularização da menstruação. Devido à combinação dos princípios ativos (etinilestradiol/acetato de ciproterona), **REPOPIL® 35** possui as mesmas propriedades dos contraceptivos orais quando **REPOPIL® 35** é tomado corretamente (seu esquecimento de tomada dos comprimidos), a probabilidade de engravidar é muito pequena. Portanto, o uso concomitante de outros contraceptivos hormonais não é necessário. **REPOPIL® 35** pode também apresentar os mesmos efeitos benéficos dos COCs: o sangramento menstrual torna-se menos intenso e o período mais curto, o que pode retardar a ocorrência de deficiência de ferro. Além disso, a menstruação frequentemente torna-se menos dolorosa.

Indicações de utilização

REPOPIL® 35 é utilizado no tratamento de doenças relacionadas aos hormônios androgênicos na mulher; tais como a acne, principalmente nas formas pronunciadas e aquelas acompanhadas de seborréia, inflamações ou foliculites de nodulos (acne papulopustulosa, acne nodulocística), queda excessiva de cabelos; casos leves de hirsutismo (excesso de pelos) e síndrome de ovários policísticos (SOP).

Riscos do medicamento

Contraindicações

- **REPOPIL® 35** não deve ser utilizado na presença das condições descritas a seguir. Caso apresente qualquer uma destas condições, informe seu médico antes de iniciar o uso de **REPOPIL® 35**.
- História atual ou anterior de problemas circulatórios, especialmente os relacionados com trombose. A trombose é a formação de um coágulo (de sangue) que pode ocorrer no veias superficiais (por exemplo: trombose venosa profunda, nos membros inferiores/pulsos, no corpo) ou em veias profundas (por exemplo: trombose venosa profunda, no corpo) (veja o item "Contraindicações e a trombose").
- História atual ou anterior de derrame cerebral, que é causado por um coágulo (de sangue) ou o rompimento de um vaso sanguíneo no cérebro;
- História atual ou anterior de ataque cardíaco (que ocorre no peito) ou de derrame (que é um episódio iktórico transitório ou um pequeno derrame reversível).
- História de enxaqueca acompanhada, por exemplo, de sintomas visuais, dificuldades para falar, fraqueza ou adormecimento em qualquer parte do corpo;
- *dilatetez melitez com lesão de veias sanguíneas;*
- História atual ou anterior de pancreatite (inflamação do pâncreas), associada com níveis altos de triglicérides (um tipo de gordura) no sangue;
- História atual ou anterior de câncer que pode se desenvolver sob a infiltração de hormônios sexuais (por exemplo: câncer de mama ou dos órgãos genitais);
- presença ou antecedente de tumor no fígado (benigno ou maligno);
- presença de sangramento vaginal sem explicação;
- ocorrência ou suspeita de gravidez;
- durante a amamentação.

Dependendo da alteração a qualquer um dos componentes de **REPOPIL® 35**. Se qualquer um destes casos ocorrerem pela primeira vez enquanto estiver tomando o tipo de **REPOPIL® 35**, descontinue o uso imediatamente e consulte seu médico. Neste período, outras medidas contraceptivas não hormonais devem ser empregadas. (veja também o item: "advertências/precauções"). **REPOPIL® 35** não deve ser utilizado por homens.

Advertências/Precauções

Se o informante está descritas várias situações em que o uso de medicamento do tipo de **REPOPIL® 35** deve ser descontinuado, ou em que pode haver diminuição da sua eficácia. Nestas situações, deve-se evitar relação sexual ou, então, utilizar adicionalmente métodos contraceptivos não-hormonais, como, por exemplo, preservativo ou outro método de barreira. Não utilize os métodos da tubalina (do tipo de Opigno-Knaus) ou da temperatura, durante. Esses métodos podem falhar, pois medicamentos do tipo de **REPOPIL® 35** modificam as variáveis de temperatura e do muco cervical que ocorrem durante o ciclo menstrual normal.

REPOPIL® 35 não protege contra infecções causadas pelo HIV (AIDS), nem contra qualquer outra doença sexualmente transmissível.

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE

O uso de medicamento do tipo de **REPOPIL® 35** requer cuidadosa supervisão médica na presença das condições descritas abaixo. Essas condições devem ser comunicadas ao médico antes do início do uso de **REPOPIL® 35**:

- tumor;
 - diabetes;
 - excesso de peso;
 - pressão alta;
 - alteração na válvula cardíaca ou alteração do batimento cardíaco;
 - inflamação das veias (flebite superficial);
 - veias varicosas;
 - qualquer familiar direto que já teve trombose, ataque cardíaco ou derrame;
 - enxaqueca;
 - epilepsia;
 - *você ou algum familiar direto tem ou já apresentou níveis altos de colesterol ou triglicérides (um tipo de gordura) no sangue;*
 - algum familiar direto que já teve câncer de mama;
 - doença do fígado ou do vesícula biliar;
 - doença do fígado ou colite ulcerativa, doença inflamatória crônica do intestino);
 - lipus eritematoso sistêmico (doença que afeta a pele do corpo inteiro);
 - síndrome hemolítico-urêmica (alteração da coagulação sanguínea que causa insuficiência renal);
 - zoster latente;
 - condição que tenha ocorrido pela primeira vez, ou piorado, durante a gravidez, ou uso prévio de hormônios sexuais como, por exemplo, perda de audição, portia (doença metabólica), herpes gestacional (doença de pele) e coréia de Sydenham (doença neurológica).
 - *você já apresentou sintomas de trombose venosa profunda, especialmente a do rosto. Nesse caso, evite a exposição excessiva ao sol ou à radiação ultravioleta;*
 - angiodemia hereditária (estrogênios exógenos podem induzir ou intensificar os seus sintomas). Consulte seu médico imediatamente se você apresentar sintomas de angiodemia, tais como: inchaço, vermelhidão, coceira, urticária, inchaço ou dor no rosto, inchaço ou vermelhidão na pele, inchaço ou vermelhidão nos olhos.
- Se algum destes casos ocorrer pela primeira vez, reaparecer ou agravar-se enquanto estiver tomando medicamento do tipo de **REPOPIL® 35**, consulte seu médico. Se a hirsutismo surgir recentemente ou intensificar-se consideravelmente nos últimos tempos, seu médico deve ser informado de pronto, devido à possibilidade de ser decorrente de um tumor.
- A associação com medicamentos contendo combinações de estrogênio/progestágeno, como no caso de **REPOPIL® 35**, baseia-se, predominantemente, nos contraceptivos orais combinados. Portanto, as precauções abaixo relacionadas para o uso de contraceptivos orais também se aplicam para o uso de **REPOPIL® 35**.

REPOPIL® 35 e trombose

A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo que pode interromper a passagem do sangue pelos vasos. A trombose às vezes ocorre nas veias profundas das pernas (trombose venosa profunda) ou no pulmão (trombose pulmonar). A ocorrência de trombose venosa profunda é rara. O risco de ocorrência de trombose venosa profunda é mais elevado durante o primeiro ano de uso em usuárias de primeira vez do contraceptivo. Pode ocorrer tanto entre usuárias como entre não-usuárias de contraceptivos orais. Também pode ocorrer durante a gravidez. O risco de ocorrência é maior entre as gestantes, sendo seguido pelas usuárias e, posteriormente, pelas não usuárias de contraceptivos orais. (Se coágulos (sangüneos) também podem ocorrer, ainda que muito raramente, nos vasos do coração (causando ataque cardíaco) ou do cérebro (causando derrame).) É possível, entretanto, que a trombose venosa profunda (na veia dos membros inferiores) também pode ocorrer no fígado, intestino, rins ou olhos. Muito ocasionalmente, a trombose pode causar incapacidade grave permanente, podendo inclusive ser fatal. O risco de ocorrência de um ataque cardíaco ou derrame aumentado com a idade. Este risco também está aumentado entre usuárias fumantes. **Descontinue o uso de cigarros durante o uso de contraceptivos orais, especialmente se tem mais de 35 anos de idade.** Caso ocorra aumento da pressão arterial enquanto estiver utilizando **REPOPIL® 35**, é provável que o médico lhe peça para descontinuar o tratamento. O risco de ocorrência de trombose venosa profunda fica aumentado temporariamente no caso de cirurgia ou durante imobilização prolongada (por exemplo, quando a cirurgia é imobilizada por gases ou talco). Em usuárias de contraceptivos orais, **REPOPIL® 35** esse risco pode ser ainda maior. Em caso de inflamação ou gripe programada, informe seu médico sobre o uso de **REPOPIL® 35**. Pode ser que ele lhe recomende a descontinuação do uso de **REPOPIL® 35** por várias semanas antes da cirurgia ou durante o período de imobilização. Somente reinicie o uso de **REPOPIL® 35** após o consentimento do seu médico. Se forem verificadas possíveis sinais de trombose, deve-se descontinuar a ingestão de **REPOPIL® 35** e consultar seu médico imediatamente.

REPOPIL® 35 e a câncer

O câncer de mama é diagnosticado com frequência um pouco maior entre as usuárias dos contraceptivos orais do que entre mulheres de mesma idade que não utilizam este método contraceptivo. Este pequeno aumento no número de diagnósticos de câncer de mama desaparece gradualmente durante os dez anos seguintes à descontinuação do uso de contraceptivos orais. Portanto, não se sabe se esta diferença é causada pelo contraceptivo. Pode ser que esta diferença seja apenas devido a maior frequência com que usuárias de contraceptivos orais consultam seus médicos. Desta forma, a detecção da doença é feita mais cedo. Em casos raros, foram observados tumores benignos de fígado e, mais raramente, tumores malignos de fígado nas usuárias de contraceptivos orais. Estes tumores podem causar hemorragias internas e morte. Consulte seu médico imediatamente, caso você tenha qualquer sintoma de sangramento interno. O fator de risco mais importante para o câncer cervical é a infecção persistente pelo HPV (papilomavírus humano). Alguns estudos indicam que o uso prolongado de contraceptivos orais pode contribuir para este risco aumentado, mas continua existindo controvérsia sobre a extensão em que esta ocorrência possa ser atribuída aos efeitos concretos, por exemplo, da realização de exame cervical e do comportamento sexual, incluindo a utilização de contraceptivos de barreira.

REPOPIL® 35 e a gravidez e a amamentação

REPOPIL® 35 não deve ser usado quando há suspeita de gravidez, durante a gestação ou durante a amamentação. Informe imediatamente ao seu médico se houver suspeita ou ocorrência de gravidez durante o uso do medicamento, ou se estiver amamentando.

Interações medicamentosas

REPOPIL® 35 e outros medicamentos

O uso de alguns medicamentos pode afetar a ação dos contraceptivos orais, reduzindo sua eficácia. Isto foi verificado com medicamentos utilizados no tratamento da epilepsia (por exemplo, primidona, fenitina, barbitúricos e carbamazepina), da tuberculose (por exemplo, rifampicina) e com alguns antibióticos (por exemplo, tetraciclinas e tetraciclínicos, os quais são utilizados no tratamento de doenças infecciosas). É possível que ocorra interação também com oxcarbazepina, topiramato, lefameto, medicamentos para tratamento da AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (por exemplo: zalcitabina, zalcitabina, o antibiótico zalcitabina e medicamentos contendo Efavirenz ou Raltegravir) e com o tratamento de estados epilépticos. Medicamentos do tipo de **REPOPIL® 35** também podem interferir na eficácia de outros medicamentos, por exemplo, medicamentos contendo ciclosporina, ou o anti-epiléptico lamotrigina. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. Também informe ao seu médico se estiver tomando **REPOPIL® 35** e qualquer outro medicamento ou dispositivo que venha a lhe prescrever outro medicamento. Pode ser necessário o uso adicional de um método contraceptivo e, neste caso, seu médico lhe dirá por quanto tempo deverá usá-lo.

É recomendável consultar o médico regularmente para que ele possa realizar os exames clínico geral e ginecológico de rotina e confirmar se o uso de **REPOPIL® 35** pode ser continuado.

Consulte seu médico assim que possível quando:

- perceber qualquer alteração na própria saúde, especialmente quando envolver qualquer um dos itens mencionados neste informativo (veja também "contraindicações e advertências");
- não se esquecer dos dados relacionados aos seus familiares diretos;
- sentir dor na mama;
- usar outros medicamentos concomitantemente (veja também "interações medicamentosas");
- ter fígado imobilizado ou subdesenvolvido (veja o item "consulte seu médico com antecedência de, pelo menos, 4 semanas);
- tiver sangramento vaginal intenso e fora do habitual;
- esquecer de tomar alguns comprimidos na primeira semana da cartela e tiver tido relação sexual no período de 7 dias antes do esquecimento;
- ocorrer dorres intensas;
- não tiver sangramento por dois meses consecutivos ou suspeitar de gravidez (não inicie nova cartela antes de consultar seu médico).

Descontinue o uso de REPOPIL® 35 e procure seu médico imediatamente se apresentar possíveis sintomas de trombose, infarto do miocárdio ou derrame cerebral, com os relacionados abaixo:

- inchaço ou dorres desconfortáveis;
 - dor intensa no peito que se irradia para o braço esquerdo;
 - falta de ar;
 - dor de cabeça mais forte, prolongada e fora do habitual ou enxaqueca;
 - perda parcial ou completa de visão ou de audição;
 - dificuldade ou impossibilidade de falar;
 - mudança repentina dos sentidos: audição, olfato ou paladar;
 - tontura ou desmaio;
 - fraqueza ou adormecimento em qualquer parte do corpo;
 - dor intensa no abdome;
 - inchaço ou dor intensa nas pernas.
- As situações e os sintomas acima são descritos e explicados em mais detalhes nos tópicos anteriores deste informativo.

Reações adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Em especial se estas reações forem graves ou persistentes, ou se houver mudança no seu estado

de saúde que possa estar relacionada com o uso do produto.

Reações graves

As reações graves associadas ao uso de **REPOPIL® 35**, assim como os sintomas relacionados, estão descritos nos itens "Contraindicações e a trombose" e "Contraindicações e a câncer". Leia estes itens com atenção e não deixe de conversar com o seu médico em caso de dúvidas ou imediatamente quando achar apropriado.

Outras possíveis reações

As seguintes reações foram observadas em usuárias de **REPOPIL® 35** sem, contudo, terem sua relação com o produto confirmada ou não. Estas reações adversas podem surgir nos primeiros meses e normalmente diminuem com o tempo de uso.

Classificação por sistema corpóreo	Frequente (≥1/100)	Pouco frequente (≥1/1.000 e <1/100)	Raro (<1/1.000)
Distúrbios nos olhos			intolerância a lentes de contato
Distúrbios gastrointestinais	náuseas, dor abdominal	vômitos, diarreia	
Distúrbios no sistema imunológico			hipersensibilidade
Investigações	aumento de peso corporal	diminuição de peso corporal	
Distúrbios metabólicos e nutricionais		retenção de líquido	
Distúrbios no sistema reprodutivo e nas mamas	dor de cabeça	enxaqueca	
Distúrbios psiquiátricos	estados depressivos, alterações de humor	diminuição do desejo sexual (libido)	aumento do desejo sexual (libido)
Distúrbios no sistema circulatório e nas mamas	dor e hipersensibilidade dolorosa nas mamas	aumento no tamanho das mamas	secreção vaginal, secreção das mamas
Distúrbios cutâneos e nos tecidos subcutâneos		erupção cutânea, coceira	eritema multiforme, eritema nodoso

Se você estiver angustiosa hereditária, estrogênios exógenos podem induzir ou intensificar os sintomas de angiodemia (veja item "advertências/precauções").

Modo de uso

Quando usado corretamente o índice de falha é de aproximadamente 1% ao ano (uma gestação a cada 100 mulheres por ano de uso). O índice de falha pode aumentar quando há esquecimento de tomada dos comprimidos ou quando estes não são tomados incorretamente, ou ainda em casos de vômitos dentro de 3 a 4 horas após a ingestão de um comprimido ou diarreia intensa, bem como interações medicamentosas.

Seja rigorosamente o procedimento indicado, pois o não-cumprimento pode ocasionar falhas na obtenção dos resultados, além de levar a sangramentos intermenstruais e uma diminuição do efeito contraceptivo. A psicologia de **REPOPIL® 35** é igual à da maioria dos contraceptivos usuais. Assim sendo, as mesmas regras de administração devem ser consideradas.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

A embalagem de **REPOPIL® 35** contém 21 comprimidos. No verso da cartela está indicado o dia da semana no qual cada comprimido deve ser ingerido. Tome um comprimido por dia, aproximadamente à mesma hora, com água se necessário. Siga a direção dos flechas, seguindo a ordem dos dias da semana, até que tenha tomado todos os 21 comprimidos. Terminadas os comprimidos da cartela, realize uma pausa de 7 dias. Neste período, cerca de 2 a 3 dias após a ingestão do último comprimido do **REPOPIL® 35**, deve ocorrer sangramento semelhante ao menstrual (sangramento por privação hormonal). Inicie nova cartela no último dia, independentemente de ter cessado ou não o sangramento. Isso significa que, em cada mês, estará sempre iniciando uma nova cartela no mesmo dia da semana e quando ocorrer o sangramento por privação mais ou menos nos mesmos dias da semana.

Quando nenhum outro contraceptivo hormonal foi utilizado nos meses anterior

Inicie o uso de **REPOPIL® 35** no primeiro dia de menstruação, ou seja, tome o comprimido indicado com o dia da semana correspondente ao primeiro dia de sangramento. Por exemplo, se a sua menstruação iniciar na sexta-feira, tome o comprimido indicado "sexta-feira" no verso da cartela, a seguir em dias, independentemente de ter cessado ou não o sangramento. Isso significa que, em cada mês, estará sempre iniciando uma nova cartela no mesmo dia da semana e quando ocorrer o sangramento por privação mais ou menos nos mesmos dias da semana.

Mudando de outro contraceptivo oral combinado, anal vaginal ou adesivo transdérmico (contraceptivo) para REPOPIL® 35

Inicie a tomada de **REPOPIL® 35** após o término da cartela do contraceptivo que estava tomando. Isso significa que não haverá pausa entre as cartelas. Se o contraceptivo que estava tomando apresenta comprimidos inativos, ou seja, sem princípio ativo, inicie a tomada de **REPOPIL® 35** após a ingestão do último comprimido ativo do contraceptivo. Caso não saiba diferenciar os comprimidos ativos dos inativos, pergunte ao seu médico. O uso de **REPOPIL® 35** também poderá ser iniciado mais tarde, no máximo até 7 dias da ingestão do último comprimido ativo (intervalo de pausa), ou no dia seguinte após ter tomado o último comprimido inativo do contraceptivo anterior. Se a paciente estiver mudando de anal vaginal ou adesivo transdérmico, deve começar preferencialmente no dia de retirada ou, no máximo, no dia previsto para a próxima aplicação.

Mudando da minipílula para REPOPIL® 35

Neste caso, deve-se descontinuar o uso da minipílula e iniciar a tomada de **REPOPIL® 35** no dia seguinte, no mesmo horário. Adicionalmente, utilize um método contraceptivo de barreira (por exemplo, preservativo) caso tenha relação sexual nos 7 primeiros dias de uso de **REPOPIL® 35**.

Mudando de contraceptivo injetável, implante ou Sistema Intra-Uterino (SIU) com liberação de progesterona para REPOPIL® 35

Inicie o uso de **REPOPIL® 35** na data prevista para a próxima injeção ou no dia de extração do implante ou do SIU. Adicionalmente, utilize um método contraceptivo de barreira (por exemplo, preservativo) caso tenha relação sexual nos 7 primeiros dias de uso de **REPOPIL® 35**.

REPOPIL® 35 e o pós-parto

No pós-parto seu médico poderá aconselhá-la a esperar por um ciclo menstrual normal antes de iniciar o uso de **REPOPIL® 35**. Às vezes, o uso de **REPOPIL® 35** pode ser iniciado com o consentimento do médico. Se estiver amamentando discuta primeiramente com seu médico.

REPOPIL® 35 e o aborto

Consulte seu médico.

O que devo fazer no caso de esquecimento da tomada de 1 comprimido?

Se houver um atraso de menos de 12 horas do horário habitual, o efeito contraceptivo de **REPOPIL® 35** é mantido. Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar e tome o próximo comprimido no horário habitual. Se houver um atraso de mais de 12 horas do horário habitual, a proteção contraceptiva de **REPOPIL® 35** pode ficar reduzida, especialmente se ocorrer esquecimento da tomada no começo ou no final da cartela. Veja abaixo como proceder em cada caso específico.

- Esquecimento de 1 comprimido na primeira semana de uso

Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar (inclui-se a possibilidade de tomar dois comprimidos de uma só vez) e continue a tomar os próximos comprimidos no horário habitual. Utilize método contraceptivo adicional (método de barreira – por exemplo, preservativo) durante os próximos 7 dias. Se leve relação sexual na semana anterior ao esquecimento da tomada do comprimido, há possibilidade de engravidar. Contorne o folto imediatamente ao seu médico.

- Esquecimento de 1 comprimido na segunda semana de uso

Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar (inclui-se a possibilidade de tomar dois comprimidos de uma só vez) e continue a tomar os dois comprimidos no horário habitual. A proteção contraceptiva de **REPOPIL® 35** está mantida. Não é necessário utilizar método contraceptivo adicional.

- Esquecimento de 1 comprimido na terceira semana de uso

Escolha uma das duas opções abaixo. Assim, se necessidade de utilizar método contraceptivo adicional:
1) Tome o comprimido esquecido assim que se lembrar (inclui-se a possibilidade de tomar dois comprimidos de uma só vez) e continue a tomar os próximos comprimidos no horário habitual. Inicie a nova cartela assim que terminar a atual. **sem haja pausa entre uma cartela e outra.** É possível que o sangramento ocorra somente após o término da segunda cartela. No entanto, pode ocorrer sangramento do tipo "gatilho" ou do escape enquanto estiver tomando os comprimidos.
2) Deixe de tomar os comprimidos da cartela atual, faça uma pausa de 7 dias ou menos, **contando inclusive o dia no qual esqueceu de tomar o comprimido e inicie uma nova cartela.** Caso deseje manter o mesmo dia da semana para a tomada da pausa, pode ser menor do que 7 dias. Por exemplo: se a cartela foi iniciada em uma quarta-feira e você esqueceu-se de tomar o comprimido na sexta-feira da semana atual, pode iniciar a nova cartela na quarta-feira da semana seguinte ao esquecimento, praticando, desta forma, uma pausa de apenas 5 dias. Veja esquema ilustrativo abaixo.

Exemplo em caso de esquecimento:

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			Início da cartela atual (1º comprimido – 1ª dia)	(2º dia)	(3º dia)	(4º dia)
(5ª dia)	(6ª dia)	(7ª dia)	(8ª dia)	(9ª dia)	(10ª dia)	(11ª dia)
(12ª dia)	(13ª dia)	(14ª dia)	(15ª dia)	(16ª dia)	(17ª dia)	(18ª dia)
(19ª dia)	(20ª dia)	(21ª dia)	Início da nova cartela (1º comprimido – 1ª dia)		Esquecimento de Tomado do comprimido	Pausa

- Mais de 1 comprimido esquecido

Se mais de um comprimido de uma mesma cartela for esquecido, consulte seu médico. Quanto mais comprimidos sequenciais forem esquecidos, menor será o efeito contraceptivo. Se não ocorrer sangramento por privação hormonal (semelhante à menstruação) no intervalo de 7 dias, pode ser que esteja grávida. Consulte seu médico antes de iniciar uma nova cartela.