

clotrimazol + acetato de dexametasona



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Creme dermatológico . Caixa com bisnaga contendo 10g, 20g, 30g, 40g, 50g e 60g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO

COMPOSIÇÃO

Cada g do creme contém:

acetato de dexametasona*.....0,443mg

clotrimazol10 mg

veículo** q.s.p.....1 g

*(equivalente a 0,400 mg de dexametasona base)

**oleato de decila, cera auto emulsionante não iônica, fenoxietanol + parabenos, petrolato líquido, propilenoglicol, citrato sódico diidratado, simeticona, água purificada.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: clotrimazol + acetato de dexametasona é um creme para uso tópico, destinado ao tratamento de eczemas e doenças inflamatórias da pele.

Cuidados de armazenamento: Manter a bisnaga tampada, à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Prazo de validade: Não utilize medicamentos com o prazo de validade vencido. O número do lote e as datas de fabricação e validade estão impressos no cartucho.

Gravidez e lactação: Em mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre de gestação ou durante a amamentação, o medicamento não deve ser usado por períodos muito prolongados e em áreas extensas do corpo. Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: clotrimazol + acetato de dexametasona deve ser aplicado na área da pele acometida após limpeza e friccionado até seu completo desaparecimento. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Mesmo que a lesão tenha desaparecido totalmente, o tratamento não deve ser interrompido, pois a doença pode voltar.

Reações adversas: Raramente podem ocorrer reações adversas na pele com a aplicação de clotrimazol, como ardor, coceira ou reações alérgicas.

O uso prolongado do produto deve ser evitado, pois pode provocar o aparecimento de outras reações da pele como espinhas, dilatação de pequenos vasos, aumento de pêlos, atrofia da pele e estrias. Informe ao seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contra-indicações e Precauções: clotrimazol + acetato de dexametasona não deve ser aplicado em pacientes hipersensíveis aos seus componentes, em casos de tuberculose da pele, sífilis, catapora (varicela), reações da pele decorrentes de vacinação contra a varíola, herpes simples, rosácea e inflamações da pele ao redor da boca. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início do tratamento ou durante o mesmo.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Características: clotrimazol + acetato de dexametasona é uma combinação de dexametasona - anti-inflamatório, antipruriginoso e antialérgico - e de clotrimazol que exerce ampla ação antimicrobica contra dermatofitos, leveduras e fungos e ação antibacteriana contra bactérias Gram-positivas (estreptococos e estafilococos).

INDICAÇÕES

Eczemas e processos inflamatórios da pele (dermatite), particularmente os causados por fungos ou bactérias sensíveis ao clotrimazol.

087919



CONTRA-INDICAÇÕES

Não deve ser usado por pacientes hipersensíveis aos seus componentes, em certas dermatoses (sífilis e tuberculose), varicela, reações de pele por vacinação contra varíola, dermatoses virais (herpes simples), rosácea e dermatite perioral.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Durante o período de gestação, principalmente no primeiro trimestre, durante a lactação e em crianças de baixa idade o medicamento pode ser usado somente por curto período de tempo, em áreas pouco extensas e em indicações precisas. Para tratamento a longo prazo é indispensável a supervisão médica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não há interações conhecidas.

REAÇÕES ADVERSAS

Reações na pele como ardência, prurido ou reações alérgicas são raras. Como as quantidades de substâncias ativas que atingem a circulação sanguínea são mínimas, reações sistêmicas são extremamente raras. Em decorrência do uso tópico de corticosteróides, principalmente se por longos períodos, são possíveis estas reações: acne por esteróides, telangiectasia, hipertricose, atrofia da pele e estrias. Portanto, o tratamento a longo prazo com corticosteróides deve ser evitado.

POSEOLOGIA

Aplicar o medicamento na área afetada, após sua limpeza, duas vezes ao dia, se possível pela manhã e à noite. A quantidade de creme a ser aplicada é proporcional à área afetada e o produto deve ser friccionado até seu desaparecimento. Nas dermatoses agudas, o creme pode ser aplicado em compressa de gaze estéril, mantendo-se o menor atrito possível desta com a região afetada. O tratamento deve ser mantido por vários dias após o desaparecimento dos sinais da doença. Dermatoses causadas por patógenos sensíveis ao clotrimazol em geral são tratadas com 8 a 10 dias de aplicação. Para obter-se a cura completa de doenças micóticas, deve-se continuar o tratamento com formulações sem corticóides.

SUPERDOSAGEM

O produto destina-se exclusivamente para uso cutâneo e não deve ser ingerido. A aplicação excessiva não produz resultados terapêuticos mais rápidos ou melhores.

PACIENTES IDOSOS

Não foram descritos cuidados especiais em pacientes idosos quando do uso deste produto.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Reg. MS: nº 1.0583.0481

Farm.Resp.: Drª Maria Geisa P. de Lima e Silva – CRF - SP nº 8.082

Nature's Plus Farmacêutica Ltda.

Rodovia SP-101, Km 08

Hortolândia/SP - CEP 13186-901

CNPJ: 45.992.062/0001-65

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado por:

EMS S/A

Rodovia SP-101, Km 8

Hortolândia/SP – CEP 13186-901

SAC 0800-191914
www.ems.com.br

BU-1419/ LAETUS 233

