

hidrocortisona



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES

Pomada dermatológica 1%. Apresentada em bisnagas com 15 g, 20 g e 30 g.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO USO EXTERNO

COMPOSIÇÃO

Cada g da pomada dermatológica contém:

hidrocortisona10 mg
excipiente* q.s.p.1 g
* petrolato líquido, propilparabeno e petrolato branco.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação esperada do medicamento: a hidrocortisona pomada é indicada para o tratamento tópico de dermatites e eczemas.

Cuidados de armazenamento: manter a bisnaga tampada, à temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

Prazo de validade: o número do lote e as datas de fabricação e validade estão impressos no cartucho do medicamento.

NÃO USE MEDICAMENTO VENCIDO, PODE SER PREJUDICIAL PARA A SUA SAÚDE.

Gravidez e lactação: informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informar ao médico se está amamentando.

Cuidados de administração: aplicar hidrocortisona pomada em finas camadas, três a quatro vezes ao dia, sobre a área afetada ou de acordo com a orientação médica.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Interrupção do tratamento: não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

Reações adversas: informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis como sensação de ardência, coceira e irritação.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Contraindicações e precauções: o produto não deve ser usado na presença de tuberculose cutânea e na maioria das infecções cutâneas viróticas, incluindo varicela, herpes e vacínia.

Pessoas hipersensíveis à hidrocortisona e aos outros componentes da fórmula, não devem usar o produto.

Evite o contato com os olhos.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja tomando, antes do início ou durante o tratamento.

NÃO TOME MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA SUA SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características: os corticosteroides difundem-se através das membranas celulares e formam complexos com receptores citoplasmáticos específicos. Esses complexos entram no núcleo celular, unindo-se ao DNA (cromatina), estimulando a transcrição do RNA-mensageiro e a posterior síntese de várias enzimas.

Supõe-se que essas enzimas são as responsáveis pelos efeitos anti-inflamatórios dos corticosteroides de aplicação tópica.

O veículo utilizado nas formulações tópicas também pode contribuir com o efeito terapêutico, proporcionando uma ação emoliente e secante, aumentando a absorção transcutânea do corticosteroide.

088661

Indicações: hidrocortisona é indicada para o alívio das manifestações inflamatórias e pruriginosas nas dermatoses sensíveis aos corticosteroides.

A hidrocortisona pomada é indicada para o tratamento tópico das afecções cutâneas de caráter eczematoso ou inflamatório, tais como eczema de contato, eczema atópico, eczema numular, eczema seborreico, líquen simples e crônico, líquen plano, intertrigo, disidrose e picadas de inseto. A hidrocortisona pomada é recomendada quando as lesões se encontram em áreas delicadas como a face, não determinando a dermatite perioral, e regiões de dobras, como a axilar e mamária, evitando-se as estrias atróficas causadas pelos corticosteroides fluorados.

Contraindicações: os corticosteroides tópicos são contraindicados na maioria das infecções viróticas cutâneas, como varicela, herpes e vacínia e na presença de tuberculose cutânea. Também é contraindicado para pacientes com história de hipersensibilidade à hidrocortisona ou aos outros componentes da fórmula.

Precauções e advertências: a hidrocortisona, devido à sua boa tolerabilidade, pode ser usado nas afecções cutâneas em crianças, uma a duas vezes ao dia.

Embora não tenha sido observado até o momento nenhuma reação adversa durante a gravidez ou lactação, a segurança do uso durante estes períodos ainda não foi estabelecida. Portanto, não deve ser largamente utilizado em pacientes grávidas.

Em presença de infecção, deve-se instituir uma terapia antibacteriana adequada.

Devem ser tomadas precauções para evitar o contato do produto com os olhos.

Reações adversas/colaterais: já foram observados os seguintes efeitos pelo uso de corticosteroides tópicos: sensação de ardência, prurido, irritação, secura, foliculite, hipertricrose, erupção acneiforme e hipopigmentação. Com a terapia oclusiva podem ocorrer as seguintes reações: maceração da pele, infecção secundária, atrofia da pele, estria e miliária.

Se ocorrer irritação, o produto deve ser descontinuado e instituída uma terapia apropriada.

Na presença de infecção, deve-se usar um antifúngico ou antibacteriano adequado.

Cuidados especiais devem ser observados no tratamento de áreas extensas ou com a terapia oclusiva, devido à possibilidade de absorção sistêmica.

Posologia: aplicar hidrocortisona pomada sobre as áreas afetadas, após a limpeza das mesmas, três a quatro vezes ao dia. Quando se obtiver resposta favorável à terapia, reduzir gradualmente a dosagem e, eventualmente, descontinuar a terapia.

Superdosagem: tratando-se de um produto tópico, a superdosagem pode ocorrer ao se tratar áreas extensas ou utilizando-se a terapia oclusiva, aumentando a possibilidade de absorção sistêmica.

Pacientes idosos: não existem recomendações especiais para este grupo de pacientes, pode ser considerada a posologia de adultos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Reg. MS: n° 1.0235.0808

Farm. Resp.: Dr^o Erika Santos Martins

CRF-SP n° 37.386

Registrado por: EMS S/A

Rua Com. Carlo Mário Gardano, 450

S. B. do Campo/SP – CEP 09720-470

CNPJ: 57.507.378/0001-01

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Fabricado por: EMS S/A

Hortolândia/SP

"Lote, fabricação e validade: vide cartucho"

SAC 0800-191914
www.ems.com.br

BU-1578 / LAETUS 213