

ENO® Tabs
Frutas Sortidas
carbonato de cálcio



BU0526-02

APRESENTAÇÕES

Comprimidos mastigáveis - 750 mg de carbonato de cálcio. Caixa contendo 12 roletes com 8 unidades cada. Roletes contendo 8 unidades. Frasco plástico contendo 48 unidades.

USO ORAL - USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido mastigável de ENO® Tabs Frutas Sortidas contém carbonato de cálcio (750mg), sacarose, amido, talco, petrolato líquido, ácido adípico, polifosfato de sódio, corantes (FD&C vermelho nº 40 CI16035, FD&C amarelo nº 6 CI15985, FD&C amarelo nº 5 CI19140, FD&C azul nº 1 CI42090) e aromas (cereja, laranja, limão e lima).

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

ENO® Tabs Frutas Sortidas é indicado como antiácido, para o alívio rápido da azia, queimação, acidez no estômago e má digestão.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

O carbonato de cálcio, princípio ativo do ENO® Tabs Frutas Sortidas, neutraliza o ácido produzido no estômago, aliviando o desconforto causado pelo excesso de acidez.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar este medicamento se você tiver história de alergia a quaisquer componentes da fórmula, se tiver hipercalcemia (excesso de cálcio dosado no sangue), hipercalcúria (excesso de cálcio dosado na urina) ou se você estiver seguindo uma dieta pobre em fósforo.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você não deve tomar mais do que a dose máxima recomendada deste medicamento. O uso prolongado em dose acima da recomendada pode levar a um aumento de cálcio no sangue. Você deve consultar o médico antes de tomar este medicamento se você faz uso de medicamentos tais como tetraciclina e ciprofloxacina porque o cálcio pode afetar a absorção de outros medicamentos. **Atenção diabéticos: contém açúcar. Este produto contém o corante amarelo de TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de outro medicamento.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar ENO® Tabs Frutas Sortidas em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). **Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.** ENO® Tabs Frutas Sortidas é apresentado

na forma de comprimidos mastigáveis nas cores rosa, laranja, amarelo e verde. **Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve mastigar 1 ou 2 comprimidos de ENO® Tabs ~~Frutas Sortidas de cada vez, ou conforme orientação~~ médica. Você não deve ultrapassar a dose diária máxima recomendada, de 10 comprimidos a cada 24 horas. Para esta dose, o período máximo de uso recomendado deste medicamento é de 2 semanas. **Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista.**

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve usar este medicamento apenas quando os sintomas ocorrerem, respeitando a dose máxima diária recomendada. **Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião dentista.**

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Este medicamento pode causar algumas reações indesejáveis, tais como prisão de ventre, gases, arroto e náusea. **Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você tomar doses excessivas deste medicamento, poderá apresentar hipercalcemia (excesso de cálcio no sangue). Os sintomas podem incluir: anorexia, náusea, vômito, prisão de ventre, dor abdominal, fraqueza muscular, fadiga, perturbação mental, polidipsia (sede em excesso), poliúria (eliminação de urina em excesso), dor óssea, nefrocalcinose (excesso de cálcio nos rins), nefrolitíase renal (formação de cálculos nos rins) e, em casos severos, arritmias cardíacas. Hipercalcemia extrema pode resultar em coma e morte. **Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

MS 1.0107.0275 Farm. Resp.: Edinilson da Silva Oliveira CRF-RJ Nº 18875 Fabricado por: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare LP – St. Louis, MO – EUA. Importado por: GlaxoSmithKline Brasil Ltda, Estrada dos Bandeirantes, 8464 Rio de Janeiro – RJ. CNPJ 33.247.743/0001-10

**Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
0800 021 15 29**

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Esta bula foi notificada a ANVISA em Abril/2013. 
CHENO/0007/13