



Benzocaína 0,2mg/mL – Borato de Sódio 60mg/mL – Cloreto de Cetilpiridínio 1mg/mL

Composição: Cada 5mL contém: Benzocaína 1mg; Borato de Sódio 300,00 mg; Cloreto de Cetilpiridínio 5,00 mg; Veículo q.s.p. 5,00 mL. Veículos: Álcool Etílico; Extrato Fluido de Malva Sylvestris; Fenosalil; Mentol; Sacarina Sódica; Sorbitol Solução a 70%; Essência de Eucalyptus Globulus; Essência de Mentha Piperita e Água Purificada.

Indicações: Alívio dos sintomas da dor de garganta, afecções da boca e aftas.

Contra-indicações: É contra-indicado em pacientes alérgicos a este medicamento.

Precauções: "Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista".

"Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde".

Modo de usar: Bochechos ou gargarejos: Agite antes de diluir. Dilua uma colher das de chá (5mL) em um copo com 50mL de água fria ou morna. Usar 4 a 5 vezes ao dia, ou de acordo com as instruções médicas ou odontológicas. No caso de aftas, se preferir, embeba um pedaço de algodão na solução e aplique diretamente sobre a lesão. Para uma melhor ação do produto, é aconselhável não comer ou beber durante 30 minutos após o uso de MALVONA®. Não ingerir. Seu uso é exclusivamente tópico. Conservar o frasco bem fechado em temperatura ambiente (15 a 30°C) e ao abrigo da luz solar. Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

"Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica ou odontológica".

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Este produto possui álcool em sua composição.

M.S 1.0143.0068.002-9

Resp. Técnico: Alberto R. V. Stein CRF-RJ 3257

Laboratório Daudt Oliveira Ltda.

Rua Simões da Mota, 57 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.026.055/0001-20 - **Indústria Brasileira**

