

## LOTEPROL™

etabonato de loteprednol 5,0 mg/mL

**INDICAÇÕES:** É indicado no tratamento de condições da conjuntiva bulbar e palpebral, da córnea e do segmento anterior do globo ocular sensíveis aos antiinflamatórios esteróides, tais como, conjuntivites alérgicas, acne rosácea, ceratite puntata superficial, ceratite pro herpes zoster, irite, ciclite e casos selecionados de conjuntivite infecciosa. Também é indicado no controle do processo inflamatório do pós-operatório das cirurgias oculares. **CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS:** Deve ser agitado vigorosamente antes de usar. Manter ao abrigo da luz e umidade. Armazenar na posição vertical. Conservar em temperatura ambiente inferior a 25°C. Não congelar. Evitar tocar a ponta do frasco goteador para reduzir os riscos de contaminação do produto. Este medicamento, depois de aberto, somente poderá ser consumido em 28 dias. Os usuários de lentes de contato devem remover as lentes antes da aplicação do produto, e aguardar de 5 a 10 minutos antes de recolocá-las. Este medicamento é contra-indicado na faixa etária infantil.

**REAÇÕES ADVERSAS:** Incluem elevação da pressão intraocular, associada ou não com lesão do nervo óptico, diminuição ou perda da acuidade e do campo visual, formação de catarata subcapsular posterior, infecção ocular secundária por patógenos, incluindo herpes simples, e perfuração do globo ocular quando há afilamento da córnea e/ou esclera. Reações adversas oculares ocorrem em 5 a 15% dos pacientes em estudos clínicos incluindo embaçamento e visão anormal, queimação na instilação, quemoses, secreção, olho seco, epífora, sensação de corpo estranho, prurido, injeção e fotofobia. Outras reações adversas oculares ocorreram em 5% dos pacientes incluíram conjuntivite, anormalidades corneanas, eritema das pálpebras, ceratoconjuntivite, irritação/dor/desconforto ocular, papilar e uveíte. Reações adversas não oculares ocorreram em menos de 15% dos pacientes, e incluíram cefaléia, rinite e faringite.

**POSOLOGIA:** Salvo prescrição contrária, aplicar uma ou duas gotas no saco conjuntival quatro vezes ao dia ou com maior frequência, caso seja necessário. Na inflamação pós-operatória, aplicar uma ou duas gotas no saco conjuntival quatro vezes ao dia, iniciando 24 horas após a cirurgia e continuando por duas semanas no período pós-operatório.

**CONTRA-INDICAÇÕES:** Na maioria das enfermidades virais da córnea e conjuntiva, incluindo ceratite epitelial por herpes simples, vacínia e varicela, e também em infecções oculares por micobactérias e doenças fúngicas das estruturas oculares. Hipersensibilidade a um dos componentes da fórmula.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações medicamentosas no uso indicado (tópico ocular). Reg. MS - 1.1961.0007

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

Data de impressão das peças publicitárias.

