

Sinustrat

cloreto de sódio

APRESENTAÇÃO

Solução nasal com 9 mg/mL de cloreto de sódio em frasco com 10 mL.

USO NASAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada mL contém:

Cloreto de sódio (DCB 02421)9,0 mg

Excipientes: *Luffa operculata*, fosfato de sódio dibásico, fosfato de sódio monobásico, álcool fenil etílico, metilparabeno, propilparabeno e água purificada q.s.p.1,0 mL

1 mL corresponde a 20 gotas.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1- PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Sinustrat é indicado como fluidificante e drenador das secreções nasais e paranasais, redutor da obstrução nasal em casos de resfriados, rinites, sinusites agudas ou crônicas.

2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Sinustrat é um descongestionante nasal que respeita a fisiologia da mucosa. Através do soluto fisiológico, umedece o muco acumulado nas narinas, facilitando a sua expulsão. O pH da solução ao redor de 6, favorece a restauração fisiológica da mucosa lesada.

3- QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sinustrat não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade individual aos componentes da fórmula e não deve ser utilizado em inaloterapia devido ao risco de ocorrer broncoespasmo. Informe ao seu médico se estiver amamentando.

De acordo com a categoria de risco de fármacos destinados as mulheres grávidas, este medicamento apresenta categoria de risco C. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Sinustrat é um medicamento somente para uso nasal. A fim de diminuir o risco de transmissão de infecção, o conta-gotas não deve ser utilizado por mais de uma pessoa. O conta-gotas deve ser lavado com água fervida e seco após cada utilização. Não existe evidência clinicamente relevante que confirme a ocorrência de interações medicamentosas entre **Sinustrat** e outros fármacos.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

5- ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar **Sinustrat** em temperatura ambiente (15 a 30 °C), protegido da luz e da umidade.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido.

Guarde-o em sua embalagem original.

Sinustrat é uma solução límpida, levemente amarelada e com odor característico de rosas.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6- COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Em instilações, podem-se usar 2 a 3 gotas em cada narina, 2 a 3 vezes ao dia. Com a cabeça levemente inclinada para trás (Fig. 1) aplique **Sinustrat** na narina esquerda, virando a cabeça para o mesmo lado (Fig. 2), permanecendo nessa posição durante alguns minutos. Em seguida, repetir do mesmo modo a aplicação na narina direita (Fig. 3). O modo de aplicação é importante para se obter melhor dispersão do produto sobre as áreas afetadas.



Fig. 01



Fig. 02



Fig. 03

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7- O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento de uma dose, retome a posologia sem necessidade de suplementação da dose. Não aplique dose dupla.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8- QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Após a aplicação de **Sinustrat** pode ocorrer, em alguns casos, ardor, espirros, lacrimejamento, coriza e, mais raramente, leve dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9- O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de superdosagem pode ocorrer irritação da orofaringe, da mucosa nasal e sangramento nasal. Nesses casos, suspenda o uso do produto e procure orientação médica.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.

Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Reg. M.S. – 1.0174.0034.008-3

Farm. Resp.: Daniela Ziolkowski CRF-SP n.º 29.486

ZURITA Laboratório Farmacêutico Ltda

Rua Domingos Graziano, 104 Araras - SP CEP:13.600-718

CNPJ n.º 44.211.936/0001-37

Indústria Brasileira

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.



02005/E



www.zurita.com.br