

## IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

### TAMARINE®

*Cassia angustifolia Vahl* + Associações

### APRESENTAÇÃO

Cápsulas

Embalagem contendo 20 cápsulas.

### USO ORAL

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada cápsula contém:

<i>Cassia angustifolia</i> Vahl. ....	240,00 mg
(equivalente à 6 mg de senosídeos)	
<i>Tamarindus indica</i> L. ....	11,70 mg
(equivalente à 0,0585 mg de ácido tartárico)	
<i>Cassia fistula</i> L. ....	11,70 mg
(equivalente à 0,0065 mg de ácido transcinâmico)	
<i>Coriandrum sativum</i> L. ....	5,40 mg
(equivalente à 0,0008 mg de ácido clorogênico)	
Excipiente q.s.p. ....	270,00 mg
(estearato de magnésio)	

#### Extrato Seco de *Cassia angustifolia* Vahl

**Nomenclatura Botânica Oficial:** *Cassia angustifolia* Vahl

**Família:** *Fabaceae*

Nomenclatura Popular: Sena

Parte da planta utilizada: Folhas

#### Extrato Seco de *Tamarindus indica* L.

**Nomenclatura Botânica Oficial:** *Tamarindus indica* L.

**Família:** *Fabaceae, Caesalpinioideae*

Nomenclatura Popular: Tamarindo

Parte da planta utilizada: Fruto

#### Extrato Seco de *Cassia fistula* L.

**Nomenclatura Botânica Oficial:** *Cassia fistula* L.

**Família:** *Fabaceae, Caesalpinioideae*

Nomenclatura Popular: Canafístula

Parte da planta utilizada: Fruto

#### Extrato Seco de *Coriandrum sativum* L.

**Nomenclatura Botânica Oficial:** *Coriandrum sativum* L.

**Família:** *Apiaceae*

Nomenclatura Popular: Coentro

Parte da planta utilizada: Fruto

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE

## 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

As indicações de TAMARINE<sup>®</sup> são amplas: é indicado para o tratamento de intestino preso, tanto crônico como secundário e na preparação para os exames radiológicos e endoscópicos.

**Indicações terapêuticas complementares:** constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas pós-operatórias e acidentes vasculares cerebrais.

## 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

TAMARINE<sup>®</sup> é uma associação de diferentes plantas medicinais com efeito laxativo que provoca uma ativação fisiológica das secreções das mucosas do trato digestivo, guardando todas as características da função intestinal normal sem nenhum sinal de irritação.

## 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

TAMARINE<sup>®</sup> é contra-indicado nas reticolites (inflamação aguda do intestino) e doença de Crohn (doença crônica inflamatória intestinal). Também é contra-indicado em síndromes dolorosas abdominais de causa desconhecida.

Você não deve utilizar este medicamento se apresentar hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

**“Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.”**

## 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

O uso de TAMARINE<sup>®</sup> em crianças só deve ser feito quando houver indicação médica. Como ocorre com todos os laxativos, o seu uso frequente e/ou prolongado pode levar à dependência desta medicação e a perda da função intestinal normal, assim como a diarreia com a perda de água e eletrólitos (sódio, potássio, etc), especialmente potássio. Recomenda-se usar esses medicamentos apenas ocasionalmente, preferencialmente não mais do que durante alguns dias ou 1 semana, salvo prescrição médica diferente.

Pacientes idosos devem iniciar o tratamento utilizando metade da dose recomendada para adultos.

**“Este medicamento pode ser utilizado durante a gravidez desde que sob prescrição médica ou do cirurgião-dentista.”**

**Interação medicamentosa:** usar o produto com cautela em pacientes em uso de antiarrítmicos tipo quinidina, amiodarona, vincamina, digitálicos, anfotericina B e diuréticos hipocalemiantes (furosemida e hidroclortiazida). Não há relatos de interações com alimentos.

**“Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.”**

## 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

**TAMARINE® cápsulas** deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30° C) em local seco e ao abrigo da luz.

**"Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem."**

**"Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original."**

TAMARINE CÁPSULA apresenta-se na forma de cápsula gelatinosa nº 1 de cor verde (tampa) e branca (corpo) contendo pó fina de cor verde acastanhado de forte odro característico

**"Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo."**

**"Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças."**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

### **USO ORAL**

Adultos: 1 a 2 cápsulas ao dia após a última refeição ou a critério médico.

Crianças menores de 12 anos: a exclusivo critério médico.

Nota: a individualidade da dose é aconselhável, podendo a mesma ser aumentada nos casos de obstipação rebelde

**"Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião - dentista."**

O uso de laxantes estimulantes deve ser feito com cautela, por isso, recomenda-se a utilização deste medicamento até que haja o alívio dos sintomas da constipação intestinal. No uso contínuo deste produto, recomenda-se não exceder o período de 7 dias sempre respeitando a dosagem recomendada. Períodos maiores de uso deste medicamento somente através de orientação médica

**“Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado”.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

No caso de esquecimento de administração, reintroduzir a medicação para o alívio dos sintomas da constipação, não devendo, portanto, dobrar a dose porque esqueceu de tomar a dose anterior.

**"Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista."**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

Por ser um laxante estimulante do intestino, alguns sintomas são muito comuns, tais como, cólicas e gases intestinais.

Outros efeitos secundários podem ocorrer, desde que respeitada a dose recomendada, são eles: diarreia, dor no estômago, refluxo, vômitos e irritação.

Procure um médico na ocorrência de sintomas raros, tais como, sangue nas fezes, cólicas severas, fraqueza e hemorragia retal.

**"Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento."**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Se a ingestão do medicamento for alta, ou seja, bem maior do que a recomendada deve-se procurar socorro médico a fim de aliviar os efeitos causados pelo medicamento.

**"Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível." Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **DIZERES LEGAIS**

Reg. MS – 1.7287.0053

Farm. Resp.: Carlos Takashi Maki - CRF-SP nº 5606

HYPERMARCAS S/A.

Av. Fernando Cerqueira César Coimbra, 1000 – Tamboré – Barueri – São Paulo

CEP 06465-0908

CNPJ nº 61.082.426/0002-07

Indústria Brasileira

Marca registrada

Atendimento ao Consumidor: 080077 17017 (Ligação Gratuita)

**"Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica".**

**"Esta bula foi aprovada pela Anvisa em (dia/mês/ano)"**

