

Vitergan[®] Zinco PL

Polivitamínico e Polimineral

Uso adulto

Forma farmacêutica e apresentação - *Comprimidos revestidos*: Cartucho com 30 comprimidos.

Composição - Cada comprimido revestido contém: Betacaroteno (pró-vitamina A) 10.000 UI (167%*); Ácido ascórbico (vitamina C) 600 mg (1.333%*); Acetato de tocoferol (vitamina E) 200 UI (2.980%*); Cobre (óxido de cobre) 1,0 mg (111%*); Selênio (selênio glicina quelato) 100 mcg (294%*); Zinco (óxido de zinco) 30 mg (428%*). (* Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à ingestão diária recomendada.)

Indicações - Suplemento vitamínico-mineral antioxidante. A composição de VITERGAN ZINCO PL permite a administração, em uma única tomada, de doses adequadas das principais vitaminas e dos principais oligoelementos, de tal forma a produzir uma varredura de radicais livres em todo organismo. VITERGAN ZINCO PL atua: Prevenindo e propiciando a eliminação dos radicais livres de fumantes, alcoólatras, indivíduos expostos à atmosfera poluída; sedentários e praticantes de exercícios extenuantes; prevenindo e auxiliando a terapêutica de doenças cardiovasculares e isquêmicas; prevenindo e auxiliando a terapêutica de doenças de natureza reumática; na prevenção e como coadjuvante terapêutico de neoplasias; como coadjuvante terapêutico das patologias originadas por distúrbios no metabolismo dos carboidratos; auxiliando o controle do desenvolvimento de metástases nos procedimentos terapêuticos oncológicos (pós-operatórios; pós-quimioterapia; pós-radioterapia); melhorando o estado imunológico geral; melhorando as funções cognitivas e a performance física; melhorando a capacidade reprodutiva; prevenindo crises de agudização de pancreatite crônica; retardando o envelhecimento celular; retardando o desenvolvimento de catarata; diminuindo a morbidade pós-operatória em idosos; diminuindo os efeitos colaterais do uso crônico de neurolépticos em pacientes psiquiátricos.

Contraindicações - VITERGAN ZINCO PL não deve ser administrado durante a gestação e lactação sem que haja orientação médica específica. Pacientes com história de alergia a alguns de seus componentes não devem ser medicados com VITERGAN ZINCO PL.

Posologia - Um comprimido revestido ao dia. Recomenda-se ingerir às refeições. VITERGAN ZINCO PL deve ser administrado por tempo prolongado para que os benefícios terapêuticos sejam alcançados. Somente o médico assistente poderá determinar o tempo necessário de administração do medicamento.

Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

Registro no M.S. 1.0155.0091.

MARJAN Indústria e Comércio Ltda.