



MODELO DE BULA DO PACIENTE

Vibral[®] dropropizina

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES

VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope: frasco de 120 mL.

VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope Pediátrico: frasco de 120 mL.

VIBRAL[®] (dropropizina) Solução oral (Gotas): frasco de 10 mL.

VIA ORAL

USO ADULTO E/OU PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS

Cada mL de VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope contém:

dropropizina 3 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: benzoato de sódio, ácido benzoico, sacarose, ácido cítrico monoidratado, corante vermelho ponceaux , aroma de framboesa, água purificada.

Cada mL de VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope Pediátrico contém:

dropropizina 1,5 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: benzoato de sódio, ácido benzoico, sacarose, ácido cítrico monoidratado, corante vermelho ponceaux , aroma de framboesa, água purificada.

Cada mL (30 gotas) de VIBRAL[®] (dropropizina) Solução Oral (Gotas) contém:

dropropizina 30 mg

Excipientes q.s.p. 1 mL

Excipientes: benzoato de sódio, ácido benzoico, sacarose, ácido cítrico monoidratado, ciclamato de sódio, corante vermelho ponceaux, aroma de framboesa, água purificada.



INFORMAÇÕES AO PACIENTE

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

VIBRAL[®] (dropropizina) é um medicamento contra tosse que age bloqueando os receptores da tosse. Apresenta uma discreta ação antialérgica, podendo ser usado no tratamento da tosse associada a condição alérgica.

A dropropizina é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal, com início de ação entre 15 a 30 minutos após a sua administração por via oral (por boca).

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

VIBRAL[®] (dropropizina) está indicado para o tratamento dos sintomas da tosse irritante e seca (sem secreção).

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

CONTRAINDICAÇÕES

VIBRAL[®] (dropropizina) é contraindicado em indivíduos que apresentem alergia à dropropizina, insuficiência respiratória grave, hipotensão (queda da pressão arterial), em pacientes asmáticos e em crianças com menos de 2 anos de idade. Não deve ser usado em casos de tosse produtiva (com secreção).

“ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.”

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O tratamento com VIBRAL[®] (dropropizina) deve ter a duração mais curta possível, geralmente poucos dias. Se os sintomas persistirem, você deverá procurar o seu médico para ser reavaliado.

Os pacientes com sensibilidade aumentada a dropropizina devem ter cuidado ao dirigir veículos ou operar máquinas, devido à possibilidade de hipotensão (queda da pressão arterial) ou sonolência.

VIBRAL[®] (dropropizina) deve ser usado com cuidado em idosos e em pacientes com alteração da função dos rins ou do fígado.

É recomendável que o uso de antitussígenos em crianças de 2 a 6 anos seja limitado.



Gravidez e lactação: VIBRAL[®] (dropropizina) não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica.

Informe seu médico se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

“INFORME AO MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.”

“ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.”

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O uso do VIBRAL[®] (dropropizina), junto com álcool e com depressores do SNC pode levar a um aumento dos efeitos colaterais da dropropizina, como a hipotensão e a sonolência.

“INFORME AO SEU MÉDICO SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.”

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Aspecto físico:

VIBRAL[®] (dropropizina) é apresentado sob a forma de solução límpida, livre de impurezas, de cor vermelho-cereja, sabor e odor de framboesa.

DOSAGEM

VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope:

Adultos e crianças maiores de 12 anos: 1 copo-medida (10 mL), 4 vezes ao dia.

VIBRAL[®] (dropropizina) Xarope Pediátrico:

Crianças de 2 a 3 anos: ¼ a 1/2 copo-medida, 4 vezes ao dia.

Crianças acima de 3 anos: 1 copo medida, 4 vezes ao dia.

VIBRAL[®] (dropropizina) Gotas:

Crianças de 2 a 3 anos: 4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia.

Crianças acima de 3 anos: 15 gotas, 4 vezes ao dia.

Adultos: 30 gotas, 4 vezes ao dia.

**O que devo fazer se esquecer de tomar uma dose do medicamento?**

Em caso de esquecimento esperar até o horário de tomada da próxima dose. Não tomar mais do que a dose normal recomendada.

“NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.”

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE SEU CIRURGIÃO-DENTISTA.”

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

As reações adversas raramente são observadas nas doses recomendadas. No caso de uso em doses mais altas ou de sensibilidade aumentada a dropropizina, as reações mais frequentes são a hipotensão (queda da pressão arterial) e a sonolência.

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Os sintomas da superdosagem de VIBRAL[®] (dropropizina) são hipotensão (queda de pressão arterial) e sonolência. Não existe antídoto específico. O tratamento usual da superdosagem aguda é a provocação do vômito, o mais precocemente possível, a não ser que o paciente esteja inconsciente. No hospital, a lavagem gástrica somente é útil se aplicada precocemente, devido à rápida absorção intestinal da dropropizina.

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e proteger da luz.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

MS: 1.0553.0348

Farm. Resp.: Fabio Bussinger da Silva
CRF-RJ nº 9.277

Número do Lote, data de Fabricação e prazo de Validade: Vide cartucho e rótulo.



Fabricado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro – RJ
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Registrado por: Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan, 735
São Paulo – SP
CNPJ 56.998.701/0001-16

ABBOTT CENTER

Central de Relacionamento com o Cliente
0800 703 1050
www.abbottbrasil.com.br