

CATAFLAM® Aerosol

diclofenaco dietilamônio

**Forma farmacêutica, via de administração e apresentações:**

Solução tópica. Tubo de alumínio aerosol com 85 mL (60 g).

**USO ADULTO**

**Composição:**

Cada g de **CATAFLAM AEROSSOL** contém 11,6 mg de diclofenaco dietilamônio, equivalente a 10,5 mg de diclofenaco potássico.

Excipientes: álcool isopropílico, álcool etílico, propilenoglicol, perfume e butano comercial.

**INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

*Como este medicamento funciona?*

**CATAFLAM AEROSSOL** é um medicamento anti-inflamatório tópico que age sobre a região inflamada aliviando o inchaço e a dor.

**Porque este medicamento foi indicado?**

**CATAFLAM AEROSSOL** foi indicado para aliviar os sintomas da inflamação como inchaço e dor, nas seguintes condições: entorses, lesões, contusões, distensões, torcicolo, dores nas costas, dor muscular, dor pós-traumática, lesões causadas pela prática esportiva; tendinite, cotovelo do tenista, bursite; alguns tipos de artrites leves (atralgia, dor articular) nos joelhos e dedos. **CATAFLAM AEROSSOL** também pode ser usado para tratar outras condições determinadas por um médico.

*Quando não devo usar este medicamento?*

**Contra-indicações:**

Não use **CATAFLAM AEROSSOL** se:

-Você já tiver apresentado alguma reação alérgica ao diclofenaco ou a outro medicamento utilizado para o tratamento de dor, febre ou inflamação, tais como o ibuprofeno ou ácido acetilsalicílico (substância também utilizada para prevenir a coagulação sanguínea).

Os sintomas de uma reação alérgica a essas substâncias podem incluir: asma, respiração ofegante, erupção cutânea ou urticária, inchaço da face ou da língua, nariz gotejante.

-Se você for alérgico a propilenoglicol, álcool isopropílico ou à qualquer outro ingrediente da formulação. O propilenoglicol pode causar, em algumas pessoas, uma leve irritação localizada na pele.

Este medicamento é contra-indicado para crianças menores de 14 anos.

Uso em crianças – Não é recomendado o uso de **CATAFLAM AEROSSOL** em crianças com idade inferior a 14 anos, exceto nos casos de artrite juvenil crônica.

**Advertências:**

Não aplique **CATAFLAM AEROSSOL** em superfícies descascadas da pele ou em feridas e escoriações abertas, ou dentro da boxa ou vagina.

Tenha cuidado para não aplicar **CATAFLAM AEROSSOL** em seus olhos. Procure um médico, se o desconforto persistir.

**CATAFLAM AEROSSOL** deve ser utilizado somente para uso externo. **CATAFLAM AEROSSOL** não deve ser ingerido. Não é recomendado o uso de **CATAFLAM AEROSSOL** em crianças com idade inferior a 14 anos, exceto em casos de artrite juvenil crônica.

**Precauções:**

Gravidez e lactação: Não utilize **CATAFLAM AEROSSOL** se você estiver grávida ou estiver amamentando. Procure a orientação de um médico caso você necessite tomar qualquer medicamento.

Interações medicamentosas: Até o momento não foram constatadas interações medicamentosas com o uso de **CATAFLAM AEROSSOL**. Em caso de dúvida, procure um médico.

Informe ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis.

Informe ao seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

*Como devo usar este medicamento?*

**CATAFLAM AEROSSOL** é uma solução incolor a amarelo opalescente, podendo apresentar ligeira turvação.

### **Características organolépticas**

Cor e odor característicos.

**CARAFLAM AEROSSOL** deve ser aplicado na pele e cobrindo a área inchada ou dolorida, 3 a 4 vezes ao dia.

### **Como usar:**

Antes de usar o medicamento, agite bem a embalagem. A quantidade apropriada poderá variar dependendo do tamanho da área afetada.

Não use **CATAFLAM AEROSSOL** por mais de duas semanas. No caso do tratamento de artrites leves nos joelhos e dedos, o produto não deve ser utilizado por mais de 3 semanas, a menos que recomendado por um médico.

Se os sintomas não melhorarem após 1 semana de uso ou se ficarem ainda piores, consulte um médico.

Se você se esquecer de aplicar **CATAFLAM AEROSSOL** aplique-o assim que possível e continue o tratamento normalmente. Se você se lembrar somente no momento da próxima aplicação, faça apenas uma aplicação, ou seja, não utilize uma quantidade em dobro do medicamento e continue o tratamento normalmente.

**SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

**NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.**

### ***Quais os males que este medicamento pode causar?***

**CATAFLAM AEROSSOL** pode algumas vezes causar efeitos indesejáveis, como por exemplo:

- Mais comuns: coceira, vermelhidão, inchaço ou formação de bolhas na região tratada da pele.
- Muito raros: erupção cutânea generalizada; reações alérgicas tais como: respiração ofegante, encurtamento da respiração ou inchaço da face.
- Muito raramente, **CATAFLAM AEROSSOL**, também pode causar aumento da sensibilidade da pele aos raios solares.

Se você apresentar estes sintomas ou outros efeitos indesejáveis não mencionados, pare de usar **CATAFLAM AEROSSOL** e procure um médico imediatamente.

**O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez?**

**CATAFLAM AEROSSOL** deve ser usado apenas externamente. Se houver ingestão acidental, procure um médico imediatamente.

*Onde e como deve guardar este medicamento?*

**CATAFLAM AEROSSOL** deve ser mantido à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C).

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

Reg.MS – 1.0068.0038.019-8