

Ph code 747

ANDANTOL[®]

cloridrato de isotipendil

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

USO TÓPICO – NÃO INGERIR

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO

Gel: Bisnaga com 40g.

COMPOSIÇÃO COMPLETA

Cada g de gel contém:

cloridrato de isotipendil7,5 mg

Excipientes: carmelose sódica, edetato dissódico, água, ácido sórbico, hidróxido de sódio e sorbitol.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

- O que é e para que serve ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil)?

ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) é um gel de ação anestésica e antialérgica que pode ser usado em alguns casos de alergias, coceira e picadas de insetos.

- Como ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) deve ser guardado?

Como todo medicamento, ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) deve ser mantido na sua embalagem original até sua total utilização. Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz e umidade.

- Qual o prazo de validade de ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil)?

O prazo de validade de ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) é de 60 meses após a data de fabricação impressa na embalagem do produto.

Ao utilizar o medicamento, confira sempre seu prazo de validade.

NUNCA USE MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. Além de não obter o efeito desejado, as substâncias podem estar alteradas e causar prejuízo para a sua saúde.

- ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) pode ser utilizado durante a gravidez e amamentação?

Como regra geral, você deve evitar qualquer medicamento neste período.

Informe seu médico a ocorrência de gravidez na vigência do tratamento ou após o seu término. Informe seu médico se está amamentando. Converse com seu médico antes de utilizar ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil).

- Como ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) deve ser utilizado?

Deve-se aplicar uma fina camada de gel sobre as partes afetadas uma ou mais vezes ao dia.

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

- O tratamento com ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) pode ser interrompido?

Não interromper o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Somente ele poderá avaliar a evolução de seu tratamento e decidir quando e como este deverá ser interrompido.

- Quais são as possíveis reações adversas com o uso de ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil)?

NÃO SÃO CONHECIDAS REAÇÕES ADVERSAS COM O USO DE ANDANTOL[®] (CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL). INFORME SEU MÉDICO SOBRE O APARECIMENTO DE QUALQUER REAÇÃO DESAGRADÁVEL.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Que cuidados devem ser tomados ao utilizar ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil)?

ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) é um medicamento de uso externo, e portanto não deve ser ingerido.

É importante evitar exposição demorada ao sol após o uso do produto, pois poderá ocorrer sensibilização da pele à luz (fotossensibilização). Nesse caso, consulte o médico para estabelecer uma terapia conveniente.

Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento.

- Quando ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) não deve ser utilizado?

ANDANTOL[®] (cloridrato de isotipendil) não deve ser utilizado por pacientes que tenham alergia ao cloridrato de isotipendil e/ou aos demais componentes da fórmula.

- Em caso de ingestão acidental do produto, que providências tomar?

Entre imediatamente em contato com seu médico ou procure um pronto-socorro, informando a quantidade exata ingerida do produto, horário da ingestão e os sintomas.

200 mm

160 mm

NÃO TOMA REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DE SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

ANDANTOL® (cloridrato de isotipendil) possui pronunciada ação anti-histamínica, anti-serotonínica e intensa atividade antialérgica.

A acentuada ação anestésica local de **ANDANTOL® (cloridrato de isotipendil)** torna o gel de especial valor no tratamento das dermatoses pruriginosas. Sua tolerabilidade é excelente também em crianças e lactentes.

INDICAÇÕES

- Dermatites, dermatoses e eczemas alérgicos;
- Dermatoses profissionais;
- Urticárias;
- Pruridos em geral, inclusive anogenital;
- Picadas de insetos.

CONTRA-INDICAÇÕES

ANDANTOL® (CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL) NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PACIENTES QUE TENHAM ALERGIA AO CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL E AOS DEMAIS COMPONENTES DA FÓRMULA.

USO NA GRAVIDEZ E LACTAÇÃO

COMO REGRA GERAL, DEVE-SE EVITAR O USO DE QUALQUER MEDICAMENTO NESTE PERÍODO.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

ANDANTOL® (CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL) É UM MEDICAMENTO DE USO EXTERNO, NÃO DEVE SER INGERIDO.

DEVE-SE EVITAR EXPOSIÇÃO DEMORADA AO SOL APÓS O USO DE **ANDANTOL® (CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL)**, POIS PODERÁ OCORRER SENSIBILIZAÇÃO DA PELE À LUZ (FOTOSENSIBILIZAÇÃO). NESSE CASO, DEVE-SE INTERROMPER O USO DO PRODUTO E ESTABELECEER UMA TERAPIA CONVENIENTE.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

REAÇÕES ADVERSAS

NÃO SÃO CONHECIDAS REAÇÕES ADVERSAS COM O USO DE **ANDANTOL® (CLORIDRATO DE ISOTIPENDIL)**.

POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada de gel sobre as partes afetadas uma ou mais vezes ao dia.

MS - 1.0573.0324

Farmacêutico Responsável: Dr. Wilson R. Farias CRF-SP nº 9555

Número de lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa.

Sob licença de MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Frankfurt - Alemanha

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2 - Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

