

MODELO DE RÓTULO-BULA

TRANSPULMIN®
guaifenesina 100 mg/15 ml

Xarope expectorante

Tratamento da tosse

Uso pediátrico

USO ORAL

Sabor Mel

150 ml

achē
www.ache.com.br

Lote:
Fab.:
Val.:

Composição: Cada 15 ml de xarope contém 100 mg de guaifenesina

Excipientes: aroma de mel, benzoato de sódio, carmelose sódica, corante caramelo, eucaliptol, mentol, metilparabeno, sacarose, sorbitol e água purificada.

Ao utilizar o medicamento, confira seu prazo de validade. **NUNCA UTILIZE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.**

INDICAÇÕES: TRANSPULMIN® é um expectorante usado para tratamento da tosse em gripes e resfriados.

CONTRA-INDICAÇÕES: HIPERSENSIBILIDADE À GUAIFENESINA OU AOS DEMAIS COMPONENTES DA FÓRMULA.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: CONSULTE SEU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE TOSSE CRÔNICA, CAUSADA POR ASMA, FUMO, BRONQUITE CRÔNICA OU ENFISEMA OU EM CASOS DE TOSSE ACOMPANHADA DE MUITO MUCO. SE ESTIVER GRÁVIDA, COM INTENÇÃO DE ENGRAVIDAR OU AMAMENTANDO, INFORME SEU MÉDICO ANTES DE INICIAR ESTE TRATAMENTO. **ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.** UTILIZE O MEDICAMENTO, RESPEITANDO SEMPRE AS DOSES, OS HORÁRIOS RECOMENDADOS E A DURAÇÃO DO TRATAMENTO. SE APÓS 7 DIAS DE TRATAMENTO, A TOSSE AINDA PERSISTIR, OU VIER ACOMPANHADA DE FEBRE, ERUPÇÕES CUTÂNEAS, DOR DE CABEÇA CONTÍNUA OU DOR DE GARGANTA, SEU MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. **ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.**

REAÇÕES ADVERSAS: PODEM EVENTUALMENTE OCORRER NÁUSEAS, VÔMITOS, DIARRÉIAS, DOR DE ESTÔMAGO, UROLITÍASE (CÁLCULOS NAS VIAS URINÁRIAS), DOR DE CABEÇA, SONOLÊNCIA, VERTIGEM, ERUPÇÕES CUTÂNEAS E URTICÁRIA. INFORME SEU MÉDICO O APARECIMENTO DE REAÇÕES DESAGRADÁVEIS.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:

Crianças de 6 a 12 anos : 15 ml (100 mg) a cada 4 horas.

Crianças de 2 a 6 anos : 7,5 ml (50 mg) a cada 4 horas.

Em qualquer idade, não exceder 6 doses por dia.

SUPERDOSAGEM: No caso de intoxicação, procure imediatamente assistência médica.

Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MS - 1.0573.0354.001-9

Farm. Resp.: Dr. Wilson R. Farias CRF-SP 9.555

Marca registrada de Viatriis GmbH & Co. KG – Frankfurt, Alemanha

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A.

Via Dutra, km 222,2

Guarulhos - SP

CNPJ 60.659.463/0001-91

Indústria Brasileira

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR; NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

Logo CAC

Código de barras