

# Coversyl® 4 mg

**Perindopril**

**Uso oral**

**Uso adulto**

**Composição e apresentação** - COVERSIL 4 MG é composto pelo perindopril, sal de erbumina (DCB 06995), 4 mg por comprimido.

**Indicações terapêuticas** - Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, prevenção de AVC secundário e redução do risco de eventos CV em pacientes com DAC estável.

**Contraindicações absolutas** - Crianças, gravidez, aleitamento, história de angioedema (edema de Quincke) relatada com o uso de inibidor da ECA e hipersensibilidade ao medicamento.

**Precauções** - Na insuficiência renal deve-se ajustar a posologia de acordo com o nível de função renal remanescente. Nestes doentes deve-se dosar regularmente a creatinina. Hipertensão renovascular.

**Reações adversas** - Raras e benignas, geralmente no início do tratamento. Tosse, fadiga e cefaleias. Alterações do humor e do sono foram referidas. Alterações digestivas pouco específicas. Raramente erupções cutâneas localizadas. Podem ser observados aumentos da ureia, do potássio e da creatinina, e diminuição da hemoglobina no sangue.

**Interações medicamentosas** - *Associações desaconselhadas:* Com diuréticos poupadores de potássio, com exceção no tratamento de insuficiência cardíaca e sais de potássio, lítio e estramustina. *Associações que necessitam de precaução de uso:* Com AINEs e ácido acetilsalicílico ( $\geq 3$  g por dia), agentes antidiabéticos (insulinas, sulfonilureias), baclofeno, diuréticos poupadores de potássio isolado ou em associação e diuréticos tiazídicos. *Associações a serem avaliadas cuidadosamente:* Com neurolépticos, antidepressivos tricíclicos, amifostina, corticoides, tetracosactídeo e alfabloqueadores para uso urológico.

**Posologia e modo de administração** - *Posologia na hipertensão:* Um comprimido de 4 mg, em tomada única diária, podendo ser aumentada para 8 mg, também em tomada única diária. *Posologia na insuficiência cardíaca:* Iniciar com meio comprimido (2 mg) uma vez ao dia e aumentar, após duas semanas, para um comprimido de 4 mg em tomada única diária, que é a dose usual de manutenção. *Posologia na doença arterial coronária:* Um comprimido de 8 mg em tomada única diária.

**Apresentações** - Caixas com 15 e 30 comprimidos.

Venda Sob Prescrição Médica.

Fabricado por: Les Laboratoires Servier Industrie - França.

SAC: 0800-7033431.

Registro no M.S. 1.1278.0051.

Importado e embalado por:  
**Laboratórios Servier do Brasil Ltda.**