

# Daflon 500

**Diosmina + Hesperidina**

**Uso oral**

**Uso adulto**

**Composição** - Fração flavonoica purificada, sob forma micronizada contendo 450 mg de diosmina (DCB 03096) e 50 mg de flavonoides expressos em hesperidina (DCB 04619).

**Farmacocinética** - No homem, após administração por via oral do medicamento, verifica-se: rápida absorção pela mucosa digestiva; forte metabolização que é evidenciada pela presença de diferentes fenóis ácidos na urina; meia-vida de eliminação de 11 horas e excreção essencialmente fecal e urinária.

**Farmacologia** - DAFLON 500 exerce uma ação sobre o sistema vascular de retorno: ao nível das veias, diminui a distensibilidade venosa e reduz a estase venosa; ao nível da microcirculação, normaliza a permeabilidade capilar e reforça a resistência capilar ao nível linfático aumentando o fluxo linfático.

**Relação dose/efeito** - A existência de relações dose/efeito, estatisticamente significativas, baseia-se nos parâmetros pletismográficos venosos: capacitância, distensibilidade e tempo de escoamento. A melhor relação dose/efeito é obtida com a posologia de 2 comprimidos ao dia.

**Atividade venotônica** - DAFLON 500 aumenta o tônus venoso. A pletismografia de oclusão venosa por manguito de compressão de mercúrio evidencia uma diminuição dos tempos de escoamento venoso.

**Atividade microcirculatória** - Os estudos realizados em duplo-cego mostraram uma diferença estatisticamente significativa entre o medicamento e o placebo. Nos pacientes que apresentam sinais de fragilidade capilar, DAFLON 500 aumenta a resistência capilar medida por angiostrometria.

**Clínica** - Os estudos clínicos realizados em duplo-cego contra placebo colocam em evidência a atividade terapêutica de DAFLON 500 em Flebologia, no tratamento da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica, dos membros inferiores.

**Indicações** - Tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica, dos membros inferiores e no tratamento dos sintomas funcionais relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário.

**Precauções de uso** - Não se dispõe, até o momento, de dados sobre o uso de DAFLON 500 em portadores de insuficiência hepática ou renal. Embora os estudos realizados em animais de laboratório não tenham demonstrado toxicidade em relação às funções de reprodução, não há avaliação em humanos - portanto, o uso do produto em gestantes e lactantes deverá ser cauteloso, considerando risco/benefício.

**Contraindicações** - Não se conhece até o momento nenhuma contraindicação para o uso de DAFLON 500, exceto hipersensibilidade previamente conhecida a um dos componentes da fórmula. Ver o item Precauções.

**Reações adversas** - As reações adversas são raras e benignas. As mais frequentemente descritas de alterações digestivas leves e de alterações neurovegetativas foram observadas, não sendo necessária a interrupção do tratamento.

**Posologia e modo de administração** - Na insuficiência venosa a posologia usual é de 2 comprimidos revestidos ao dia: um pela manhã e outro à noite, de preferência durante as

refeições. Na crise hemorroidária aguda: 6 comprimidos ao dia durante os quatro primeiros dias e, em seguida, 4 comprimidos ao dia, durante três dias.

**Superdosagem** - Não se dispõe até o momento de dados acerca da superdosagem.

**Apresentações** - Caixas com 15, 30 e 60 comprimidos revestidos.

SAC: 0800-7033431.

Registro no M.S. 1.1278.0003.

Fabricado por:

**Laboratórios Servier do Brasil Ltda. e Laborvida Laboratórios Farmacêuticos Ltda.**

## **SERVIER**

**laboratórios servier do brasil ltda.**

### **MATRIZ:**

22775-113 - Rio de Janeiro-RJ

Estrada dos Bandeirantes, 4211 - Curicica - Jacarepaguá

Tel.. 0XX(21) 2142-1414

Fax. 0XX(21) 2142-1415

SAC..... 0800-7033431