

# Indapen SR<sup>®</sup>

## Indapamida

**Composição** - Cada comprimido revestido de liberação prolongada de INDAPEN SR<sup>®</sup> contém: indapamida 1,5 mg.

**Contraindicações** - Hipersensibilidade conhecida à indapamida, às sulfonamidas; insuficiência hepática ou renal grave; encefalopatia hepática; hipocalemia. Devido à presença de lactose, este medicamento é contraindicado nos casos de galactosemia congênita, síndrome de má absorção da glicose e galactose ou deficiência de lactase. Este medicamento é contraindicado para crianças.

**Reações adversas** - A maior parte dos efeitos adversos relacionados aos parâmetros clínicos e laboratoriais é dose-dependente. Os diuréticos tiazídicos, incluindo a indapamida, podem causar: *Alterações no sistema sanguíneo e linfático*: Muito raramente: trombocitopenia, leucopenia, agranulocitose, anemia aplástica e anemia hemolítica. *Alterações no sistema nervoso*: Raramente: vertigem, fadiga, dor de cabeça e parestesia. *Alterações cardíacas*: Muito raramente: arritmia e hipotensão. *Alterações gastrintestinais*: Raramente: náusea, constipação e secura na boca. Muito raramente: pancreatite. *Alterações hepatobiliares*: No caso de insuficiência hepática, pode ocorrer encefalopatia hepática. Muito raramente: alteração na função hepática. *Condições cutâneas e tegumentares*: Reações de hipersensibilidade, principalmente dermatológicas (comuns: erupções maculopapulares e menos comuns: púrpura) em pacientes predispostos aos sintomas alérgicos e asmáticos. Possibilidade de exacerbação de lúpus eritematoso agudo.

**Posologia** - Um comprimido ao dia, de preferência pela manhã. O aumento da dose não aumenta a ação anti-hipertensiva da indapamida, enquanto que aumenta o seu efeito diurético.

**Apresentação** - Embalagem com 30 comprimidos revestidos de liberação prolongada.

Registro no M.S. 1.0525.0017.

**TORRENT do Brasil Ltda.**