

Azukon MR

Gliclazida

Uso adulto

Composição e apresentação - Cada comprimido de liberação modificada contém 30 mg de gliclazida. Embalagens com 30 comprimidos de liberação modificada.

Indicações - Tratamento oral de diabetes não insulino dependente, diabetes no obeso, diabetes no idoso e diabetes com complicações vasculares.

Contraindicações - Em pacientes com reconhecida sensibilidade às sulfamidas. Não deve ser usada durante a gravidez.

Precauções e advertências - Risco de ocorrer hipoglicemia quando administrada sem justificativa em diabéticos controlados com dieta e em pacientes com alimentação insuficiente, e nos casos de insuficiência renal e/ou hepática graves. No caso de intervenção cirúrgica, o uso da insulina deve ser levado em consideração.

Interações medicamentosas - *Associações que podem levar à hipoglicemia:* Miconazol oral, AINEs (principalmente os salicilatos), sulfamidas antibacterianas, cumarínicos, IMAOs, betabloqueadores, diazepam, tetraciclina, cloranfenicol, clofibrato maleato de perexilina e álcool. *Associações que podem reduzir a ação de AZUKON MR:* Barbitúricos. *Associações que podem levar à hiperglicemia:* Corticoides, diuréticos, estroprogestativos.

Reações adversas - Alguns casos de reações cutâneas, que regrediram após a interrupção do medicamento; discrasias sanguíneas são raras e reversíveis. Distúrbios digestivos, do tipo náuseas, vômitos, gastralgias, diarreia e constipação, são raros. Estes efeitos diminuem tomando AZUKON MR durante as refeições.

Posologia - A dose diária pode variar de 30 a 120 mg em uma única tomada oral. Recomenda-se a tomada do medicamento juntamente com o café da manhã. Como para todos os medicamentos hipoglicemiantes, a dose deverá ser ajustada conforme a resposta individual de cada paciente. *Posologia inicial:* 1 comprimido de 30 mg/dia. Os ajustes posológicos, quando necessários, serão feitos em escalas de 30 mg, em função da resposta glicêmica e deverão observar um intervalo de, pelo menos, 2 semanas entre si. A dose diária não deve ultrapassar 120 mg, sempre em tomada única no café da manhã. A posologia para o idoso é a mesma que para o adulto com menos de 65 anos. Nos pacientes portadores de insuficiência renal leve ou moderada a posologia será a mesma dos pacientes com função renal normal. Os comprimidos devem ser engolidos inteiros, sem mastigar.

Venda Sob Prescrição Médica.

Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.

Registro no M.S. 1.0525.0019.0028.

TORRENT do Brasil Ltda.